

ارتباط پلی مورفیسم rs 2241766 ژن آدیپونکتین با سطح سرمی آدیپونکتین، مقاومت به انسولین و دیابت نوع دو در یک جمعیت ایرانی

نسرین حاجیلو^۱، معصومه نژادعلی^{*۱}، لاله قانعی^۲

مقاله پژوهشی

مقدمه: آدیپونکتین پپتید مترشحه از سلول‌های چربی است که نقش مهمی در بهروز مقاومت به انسولین و دیابت نوع دو ایفا می‌کند. تعدادی از پلی مورفیسم‌های تک نوکلئوتیدی در ژن آدیپونکتین با کاهش بیان آدیپونکتین و T2DM ارتباط دارد. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی پلی مورفیسم rs 2241766 در ژن آدیپونکتین و ارتباط آن با سطح آدیپونکتین، مقاومت به انسولین و دیابت نوع ۲ در افراد پر دیابتی/دیابتی و سالم بود.

روش بررسی: این مطالعه به روش مورد-شاهدی انجام شد که ۷۳ فرد مبتلا به پر دیابت/دیابت با قند خون ناشتا بیشتر از ۱۰۰ میلی گرم در دسی لیتر، بدون سابقه مصرف دارو به عنوان گروه مورد و ۷۶ نفر با قند خون ناشتا ۱۰۰-۷۰ میلی گرم در دسی لیتر به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. متغیرهای ها بیوشیمیایی و تن سنجی با روش‌های استاندارد و میزان آدیپونکتین و انسولین باکیت الایزا اندازه‌گیری شد. تعیین ژنتیک به روش PCR-RFLP انجام شد. داده‌ها به وسیله نرمافزار SPSS Inc., Chicago, IL; version 16 تجزیه و تحلیل شد.

نتایج: آنالیز رگرسیونی نشان داد پلی مورفیسم rs 2241766 ارتباط معنی داری با دیابت و مقاومت به انسولین ندارد. بین حاملین TG و TT در دو گروه سالم و پر دیابت/دیابت در هیچ یک از متغیرها اختلاف معنی داری یافت نشد. ارتباط منفی بین آدیپونکتین و مقاومت به انسولین مشاهده شد ($r = -0.225$, $p < 0.01$).

نتیجه‌گیری: براساس این مطالعه پلی مورفیسم rs 2241766 با سطح آدیپونکتین، مقاومت به انسولین و دیابت نوع ۲ ارتباط ندارد، اما بین آدیپونکتین و مقاومت به انسولین ارتباط وجود دارد.

واژه‌های کلیدی: پلی مورفیسم، دیابت نوع ۲، آدیپونکتین، مقاومت به انسولین، rs2241766

ارجاع: حاجیلو نسرین، نژادعلی معصومه، قانعی لاله. ارتباط پلی مورفیسم rs 2241766 ژن آدیپونکتین با سطح سرمی آدیپونکتین، مقاومت به انسولین و دیابت نوع دو در یک جمعیت ایرانی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ۱۳۹۸؛ ۲۷(۲): ۲۷-۱۲۱۶.

۱- گروه زیست شناسی، واحد اسلام شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام شهر، ایران

۲- گروه پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تهران پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

*نویسنده مسئول؛ تلفن: ۰۹۱۲۳۸۷۵۴۹۳، پست الکترونیکی: ma_nejadali@yahoo.com، کد پستی: ۳۳۱۴۷-۶۷۶۵۳

مقدمه

دیابت یک بیماری متابولیکی و یک مشکل بزرگ بهداشتی با شیوع رو به افزایش درجهان است (۱) که بهطور نگران کننده‌ای در حال افزایش است. شیوع دیابت در ایران بالا و حدود ۷/۷ درصد گزارش شده است (۲). دیابت شایع ترین اختلال غدد درون ریز است (۳) که به علت اختلال در عملکرد سلول‌های بتا پانکراس یا مقاومت سلول‌های بدن در برابر انسولین ایجاد می‌شود (۱). آدیپونکتین، یک سیتوکین ضدالتهابی است که بهمیزان فراوان، از بافت چربی ترشح می‌شود (۴). ژن آدیپونکتین روی کروموزوم ۳q27 قرارگرفته است (۵). اندازه آن ۱۶kD و حاوی ۳ اگزون و ۲ اینtron است که پروتئینی با ۲۴۴ اسیدآمینه را می‌سازد (۶) آدیپونکتین دارای ۴ دومن قابل تشخیص است (۶,۷) که در انتهای آمین دارای توالی راهنماست، بهنبال آن یک ناحیه بسیار متغیر کوتاه و بعد آن یک هلیکس کلاژن مانند و در انتهای C یک دومن کروی، مشابه با ساختار TNF و فاکتور کمپلمان C1q وجود دارد (۶).

غلظت آدیپونکتین پلاسمما در زنان بیشتر از مردان است که احتمالاً بهدلیل وجود مقدار بیشتر چربی در زنان است (۸) آدیپونکتین دارای دو گیرنده می‌باشد. هر دو گیرنده فعالیت پروتئین کیناز وابسته به آدنوزین منوفسفات را افزایش داده و بهنبال آن اکسیداسیون اسیدهای چرب و جذب گلوکز را القا می‌کنند (۶). آدیپونکتین با تاثیر روی جذب گلوکز عضلانی، هیبرگلیسمی را در بیماران دیابتی می‌کاهد و بافت‌های بدن را به انسولین حساس می‌کند (۴). آدیپونکتین دارای اثرات ضدالتهابی و حساس کننده بهانسولین است و از این‌رو نقش حافظتی در دیابت نوع ۲، چاقی، فشار خون بالا و بیماری عروق کرونر دارد. کاهش سطح آدیپونکتین ناشی از تعامل عوامل ژنتیکی و محیطی (۴)، نقش مهمی در ایجاد مقاومت به انسولین، T2DM (۹) و چاقی ایفا می‌کند (۱۰). مطالعات نشان داده است در جمعیت‌هایی که سطح آدیپونکتین پایین تری دارند دیابت نوع ۲ شایع‌تر است (۶).

روش بررسی

در یک راست، در میانه محدوده بین دنده آخر و استخوان لگن قرار گیرد، که معمولاً اندازه دور کمر، بالای ناف اندازه گیری می شود. از افراد مراجعه کننده با رعایت ۱۴-۱۲ ساعت ناشتاپی ۱۰ میلی لیترنمونه خون محیطی گرفته شد، که ۵ میلی لیتر از نمونه مذکور در لوله حاوی ضد انعقاد (mg/mlEDTA) ۳ و باقی مانده آن در لوله ای فاقد ضدانعقاد ریخته شد. بعد از لخته شدن خون، لوله فاقد ضد انعقاد به مدت ۵ دقیقه در دمای اتاق سانتریفیوز (rpm ۳۰۰۰) و سرم آن جدا شد و در لوله های کوچک دردار با حجم نهایی ۱/۵ میلی لیتر تقسیم گردید و به پژوهشگاه غدد و متابولیسم دانشگاه شهید بهشتی جهت اندازه گیری متغیرهای بیوشیمیائی منتقل گردید.

تعیین ژنتیپ

برای تعیین ژنتیپ ابتدا استخراج DNA از لوله های ضد انعقاد توسط روش Salting Out (۱۸) انجام شد. سپس با استفاده از روش PCR یک توالی ۳۷۲ جفت بازی از اگزون شماره ۲ مربوط به ژن آدیپونکتین که حاوی پلی مورفیسم Applied T/G +45 بود، در دستگاه ترموسایکلر مدل 2070 Biosystems ABI تکثیر گردید. برای این کار از دو پرایمر استفاده شد که توسط نرم افزار Gene runner طراحی شد. عملکرد اختصاصی آغازگرها با Blast تائید و توسط شرکت تولیدی و تحقیقاتی پیشگام تهیه گردید:

FORWARD primer:

5'_GAAGTAGACTCTGCTGAGATGG_3'

REVERSE primer:


5'_TATCAGTGTAGGAGGTCTGTGATG_3'

جهت انجام PCR، مخلوط نهایی را با حجم نهایی ۲۵ میکرولیتر درون میکروتیوب های ۰/۲ آمده کردیم. مخلوط Master mix (dNTP, Taq polymerase, واکنش شامل MgCl₂) به میزان ۱۲/۵ میکرولیتر، یک میکرولیتر (primer reverse و primer forward) میکرولیتر از هر پرایمر (۰/۹ آب مقطر بود که جهت تکثیر قطعه حامل پلی مورفیسم Thermal cycler rs 2241766 ژن آدیپونکتین به دستگاه

جمعیت مورد بررسی، از افراد ساکن تهران و استان زنجان بودند. شرکت کنندگان در این مطالعه مورد و شاهدی، (زن و مرد) با حداقل ۱۲ سال و حداکثر ۷۰ سال و از مراجعه کنندگان به آزمایشگاه تشخیص طبی خصوصی شهر زنجان و بیمارستان بوعلی تهران انتخاب شدند. زمان مطالعه از آذر ۱۳۹۵ لغاًی شهریور ۱۳۹۶ بود که بر اساس تفاهم نامه هلسینکی انجام گردید. حجم نمونه بر اساس فرمول، نرم افزار MedCalc محاسبه شد. در این مطالعه، ۷۳ نفر، در گروه بیمار مبتلا به پره دیابت/ دیابت نوع دو با قند خون ناشتاپی بیشتر از ۱۰۰ میلی گرم در دسی لیتر (اطلاعات ۳ نفر از بیماران به دلیل عدم رضایت کامل در آنالیز آماری حذف شد) و ۷۶ نفر در گروه کنترل، با قند ناشتاپی بین ۷۰ تا ۱۰۰ میلی گرم در دسی لیتر قرار گرفتند. شرط ورود افراد به گروه پره دیابت/ دیابت، قند بالای ۱۰۰ میلی گرم در دسی لیتر و عدم سابقه مصرف داروی ضد دیابت بود که این مهم از ویژگی های منحصر بفرد این مطالعه بود. جهت رعایت موازین اخلاقی، اطلاعات در زمینه این مطالعه به افراد داده شد که در صورت داشتن رضایت کامل در این مطالعه وارد شدند. شرط ورود افراد در این طرح، بیمارانی بودند که سابقه مصرف داروی ضد دیابت نداشتند و شرط خروج سابقه مصرف داروی متابولیکی، تخمدان پلی کیستیک، مصرف مواد مخدر، بیماری حاد، حاملگی، بیماری کلیوی، بیماری های کبد، بیماری قلبی، سرطان، بیماری های ایمنی، عفونت و فشار خون بالا و سایر بیماری های شناخته شده بود. افراد مبتلا به پره دیابت دارای قند خون ناشتا ۱۰۰ تا ۱۲۵ میلی گرم در دسی لیتر بودند در حالی که قند خون ناشتا افراد دیابتی ۱۲۶ میلی گرم در دسی لیتر و بالاتر بود (۱۷).

افراد مراجعه کننده پس از ۲ بار اندازه گیری قند خون به قرار گیری در دو گروه مورد بررسی، هدایت شدند. اندازه گیری BMI(kg/m²) به روش استاندارد انجام شد. ابتدا وزن افراد با استفاده از ترازوی عقربه ای سکا و با دقت ۰/۱Kg، سپس قد افراد با استفاده از قدسنج دیواری سکا، بدون کفش و با دقت ۰/۵ cm اندازه گیری شد. برای تعیین دور کمر، متر می باشد.

گردید. تعیین ژنوتیپ با تکنیک RFLP و آنزیم محدود کننده SmaI شرکت فرمانتاز انجام شد. محصولات PCR مدت ۱۶ ساعت توسط آنزیم SmaI در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد انکوبه شدند. سپس ژنوتیپ‌ها با الکتروفورز بر روی ژل آگارز ۲٪ تعیین شد. رنگ‌آمیزی ژل با استفاده از Gel Red انجام و نتیجه الکتروفورز با دستگاه Transluminator مشاهده گردید. نتیجه الکتروفورز محصولات PCR پلی مورفیسم rs 2241766 با استفاده از تکنیک RFLP در شکل (۱) نشان داده شده است. ژنوتیپ TT با باند ۳۷۲ جفت باز، ژنوتیپ TG با باندهای ۳۷۲، ۲۰۹، ۱۶۳ جفت باز و ژنوتیپ GG با باندهای ۲۰۹، ۱۶۳ جفت باز مشخص گردید (شکل ۱). در این مطالعه ۶ نفر با ژنوتیپ GG مشاهده شد، از این رو در آنالیز آماری حذف گردید.



شکل ۱: نتیجه هضم آنزیمی پلی‌مورفیسم SmaI: در این شکل طول قطعات بریده شده بوسیله آنزیم نمایش داده شده است. ژنوتیپ TG سه باند با طول‌های ۳۷۲ bp و ۲۰۹ bp و ۱۶۳ bp؛ ژنوتیپ TT دو باند با طول‌های ۲۰۹ bp و ۳۷۲ bp؛ ژنوتیپ GG یک باند با طول ۳۷۲ bp.

گروه تقسیم شدند افراد حساس به انسولین که میزان HOMA-IR از ۲/۲۴ کمتر است ۲/۲۴ بود. افراد مقاوم به انسولین بینابینی ۳/۵۹ و افراد مقاوم به انسولین که میزان HOMA-IR≤ بیشتر از ۳/۵۹ بود (۱۹).

تجزیه و تحلیل آماری

برای تجزیه و تحلیل داده‌های آماری و بررسی فرضیات تحقیق، از آمارهای توصیفی و آزمون‌های استنباطی متناسب با داده‌ها و متغیرها استفاده گردید. برای استفاده از شاخص‌های مناسب آمار توصیفی و آمار استنباطی با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنف توزیع متغیرهای مورد مطالعه مشخص شد. برای تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق از آزمون HOMA-IR

بررسی پارامترهای بیوشیمیایی

میزان کلسیرون تام، تری‌گلیسرید سرم و قد خون ناشتا، HDL-C به روش رنگ‌سنگی آنزیمی و با کیت‌های تجاری Biotechnica پارس‌آزمون و با روش الیزا توسط دستگاه LDL-کلسیرون از طریق فرمول مدل BT3500 اندازه‌گیری شد. فرمول کلسیرون از طریق فرمول فریدوالد محاسبه گردید. غلظت سرمی آدیپونکتین و انسولین با استفاده از کیت ELISA کمپانی Mercodia سوند در پژوهشگاه غدد و متابولیسم شهید بهشتی اندازه‌گیری شد. مقاومت به انسولین بر اساس فرمول HOMA-IR = $\frac{\text{غلوكز ناشتا سرم}}{\text{انسولین ناشتا سرم}} \times 22.5$ (microunit/lit) محاسبه شد. با توجه به مقادیر HOMA-IR جمعیت مورد مطالعه به سه

نشد اما در سایر متغیرها یعنی سن، نمایه توده بدنی، دور کمر، دور باسن، تری گلیسرید و قند ناشتا تفاوت معنی دار بود (جدول ۱). بررسی متغیرهای بیوشیمیایی و تن سنجی برای افراد سالم و بیمار به تفکیک ژنتوپیپ ها در جدول ۲ و ۳ آمده است. نتایج نشان داد تفاوت معنی دار در متغیرهای بیوشیمیایی و تن سنجی در حاملین ژنتوپیپ های پلی مورفیسم rs2241766 برای افراد سالم و بیمار وجود ندارد ($p > 0.05$). در جدول ۲) متغیرهای بیوشیمیایی و تن سنجی برای افراد سالم به تفکیک ژنتوپیپ ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد در افراد سالم حامل ژنتوپیپ TG TT در هیچ یک از متغیرهای بیوشیمیایی و تن سنجی اختلاف معنی دار وجود ندارند ($p > 0.05$). در جدول ۳ متغیرهای بیوشیمیایی در افراد بیمار به تفکیک ژنتوپیپ ها آمده است، نتایج نشان می دهد در افراد بیمار حامل ژنتوپیپ های TT, TG نیز، در هیچ یک از متغیرهای بیوشیمیایی و تن سنجی تفاوت معنی دار وجود ندارند ($p > 0.05$). متغیرهای کمی با توزیع نرمال به صورت میانگین و انحراف استاندارد و متغیرهای کمی با توزیع چوله به صورت میانه و دامنه میان چارکی گزارش شدند.

تی مستقل، من ویتنی بهره گرفته شد. عوامل کیفی با استفاده از آزمون کای دو یا فیشر مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی ارتباط بین ژنتوپیپ ها با دیابت، از آنالیز آماری رگرسیون لجستیک، محاسبه OR با فاصله اطمینان استفاده شد. SPSS Inc., تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Chicago, IL; version 16 انجام شد و سطح معنی دار آماری 0.05 در نظر گرفته شد.

ملاحظات اخلاقی

پروپوزال این تحقیق، در کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران مورد تایید قرار گرفته است (کد اخلاق (IR.IAU.TMU.REC.1396.290).

نتایج

در این مطالعه ۱۴۹ فرد شرکت کردند که ۷۳ نفر پره دیابتی / دیابتی و ۷۶ نفر سالم بودند. میانگین سنی افراد دیابتی ۵۲/۹ و افراد سالم ۳۶/۹ سال بود. در این مطالعه بین دو گروه پرهدیابتی / دیابتی و سالم در متغیرهای انسولین، کلسترول، آدیپونکتین، LDL و HDL تفاوت معنی دار مشاهده شد.

جدول ۱: توزیع متغیرهای تن سنجی، متغیرهای قند و لیپید، هومون های انسولین و آدیپونکتین در دو گروه سالم و بیمار

P-value	سالم	بیمار	متغیر کمی
<0.001	۳۶/۹±۱۱/۷	۵۲/۹±۱۳/۱	سن(سال)
<0.001	۲۴/۲ (۲۱/۵-۲۷/۳)	۲۷/۴ (۲۴/۸-۲۹/۸)	نمایه توده بدنی(کیلوگرم بر متر مربع)
0.006	۱۰/۳±۱۳/۱	۹۶/۳±۱۲/۶	دور کمر(سانتی متر)
0.004	۹۶/۹±۱۵/۷	۱۰/۵±۱۴/۶	دور باسن(سانتی متر)
0.232	۴۷ (۴۰/۲-۵۷)	۴۶ (۳۴-۵۴)	HDL(میلی گرم بر دسی لیتر)
0.143	۱۰/۴/۳±۲۳/۲	۱۱۵/۳±۴۲	LDL(میلی گرم بر دسی لیتر)
0.055	۱۶۶/۸±۴۰/۱	۱۸۵/۸±۴۹	کلسترول(میلی گرم بر دسی لیتر)
0.241	۹۵/۵ (۸۳/۲-۱۶۱)	۱۳۸ (۹۸/۷-۲۰۲)	تری گلیسرید(میلی گرم بر دسی لیتر)
<0.001	۸۸/۵ (۸۲-۹۴)	۱۴۶ (۱۲۳-۱۸۰)	قندناشتا(میلی گرم بر دسی لیتر)
0.219	۸/۴ (۵/۵-۱۳/۹۶)	۹/۵ (۶/۱-۱۵/۳)	انسولین(میلی یونیت بر لیتر)
0.115	۷/۴ (۵/۴-۱۱/۳)	۶/۶ (۵/۲-۹/۴)	آدیپونکتین(میلی گرم بر لیتر)

جدول ۲: بررسی متغیرهای بیوشیمیایی و تن سنجی در افراد سالم حامل ژنوتیپ‌های TG و TT در پلی‌مورفیسم rs2241766

P-value	TG	TT	متغیر
۰/۱۶۶	۳۱/۶±۱۲/۲	۳۷/۸±۱۰/۶	سن (سال)
۰/۵۳۷	۲۴/۷(۲۳/۱-۲۸/۳)	۲۴/۲(۲۱/۵-۲۷/۲)	نمایه توده بدنی (کیلوگرم بر متر مربع)
۰/۴۷۲	۱۰/۱۵±۵/۳	۱۰/۵۲±۱۴	دور کمر (سانتی متر)
۰/۶۳۰	۹۴±۸/۳	۹۷/۳±۱۸/۴	دور باسن (سانتی متر)
۰/۳۷۳	۴۶(۴۱-۴۸)	۵۳(۴۰-۶۱/۵)	HDL (میلی گرم بر دسی لیتر)
۰/۰۸۷	۱۱۹/۳±۱۷/۸	۱۰۰/۲±۲۵/۳	LDL (میلی گرم بر دسی لیتر)
۰/۳۴۸	۱۸۷/۱±۲۰/۷	۱۶۰/۱±۴۸	کلسترول (میلی گرم بر دسی لیتر)
۰/۸۸۰	۹۴ (۸۵-۱۱۳)	۹۵/۵(۷۸-۱۵۶/۷)	تری گلیسرید (میلی گرم بر دسی لیتر)
۰/۱۲۲	۹۲ (۸۶/۵-۹۶)	۸۷ (۸۰-۹۴)	قندناشتا (میلی گرم بر دسی لیتر)
۰/۰۸۱	۵/۸ (۴/۸-۹)	۹/۵ (۶/۳-۱۶)	انسولین (میلی یونیت بر لیتر)
۰/۹۱۰	۷/۲ (۶/۱-۱۰/۶)	۷/۳(۵/۵-۱۱/۶)	آدیپونکتین (میلی گرم بر لیتر)

جدول ۳: بررسی متغیرهای بیوشیمیایی و تن سنجی در بیماران حامل ژنوتیپ‌های TT و TG در پلی‌مورفیسم rs2241766

P-value	TG	TT	متغیر
۰/۹۰۱	۵۲/۵±۱۴/۱	۵۲/۹±۱۳/۴	سن (سال)
۰/۹۱۶	۲۷/۱(۲۴/۳-۳۰/۱)	۲۷/۳(۲۴/۷-۲۹/۳)	نمایه توده بدنی (کیلوگرم بر متر مربع)
۰/۵۰۶	۹۴/۱±۱۸/۳	۹۶/۷±۱۰/۶	دور کمر (سانتی متر)
۰/۸۷۹	۱۰/۴±۱۷/۱	۱۰/۵۲±۱۴/۷	دور باسن (سانتی متر)
۰/۴۰۹	۴۶ (۴۲-۵۶)	۴۵ (۴۴-۵۳)	HDL (میلی گرم بر دسی لیتر)
۰/۷۰۸	۱۱۶/۹±۳۳/۹	۱۱۱/۷±۴۱/۸	LDL (میلی گرم بر دسی لیتر)
۰/۰۶۶	۱۹۵/۵±۳۲/۹	۱۹۰±۵۴/۲	کلسترول (میلی گرم بر دسی لیتر)
۰/۵۱۶	(۱۰/۱۵-۲۰/۰) ۱۴۷	۱۳۶ (۹۱-۲۰/۱)	تری گلیسرید (میلی گرم بر دسی لیتر)
۰/۶۷۶	۱۵۰ (۱۲۲-۲۰/۷)	۱۴۰ (۱۱۹-۱۹۹)	قندناشتا (میلی گرم بر دسی لیتر)
۰/۷۱۷	۹/۴ (۷/۷-۱۳/۵)	۸/۶ (۶-۱۵/۲)	انسولین (میلی یونیت بر لیتر)
۰/۵۱۲	۶/۶ (۴/۲-۹/۲)	۶/۶ (۵/۲-۹/۵)	آدیپونکتین (میلی گرم بر لیتر)

برای مقایسه، متغیرهای با توزیع نرمال از آزمون تی مستقل و متغیرهای چوله از من ویتنی استفاده شد متغیرها با $p < 0.05$ قابل استناد است.

ارتباط معنی دار بین این پلی‌مورفیسم و مقاومت به انسولین وجود ندارد ($p=0.725$). بررسی همبستگی آدیپونکتین با قند خون ناشتا و شاخص مقاومت به انسولین با استفاده از آزمون اسپیرمن نشان داد آدیپونکتین با شاخص مقاومت به انسولین ارتباط معنی دار و منفی دارد ($r=-0.225$, $p<0.01$). به عبارت دیگر افزایش سطح آدیپونکتین موجب کاهش مقاومت به انسولین می شود.

تحلیل رگرسیونی برای ژنوتیپ‌ها در جدول ۴ نشان داد تفاوت معنی دار در فراوانی افراد با ژنوتیپ‌های GG, TG, TT، در دو گروه سالم و پرهدیابتی / دیابتی وجود ندارد به عبارت دیگر ارتباط آماری معنی داری بین ژنوتیپ‌ها با بیماری دیابت وجود ندارد ($p=0.371$, $p=0.123$, $p=0.112$). بررسی ارتباط ژنوتیپ‌های پلی‌مورفیسم با مقاومت به انسولین (جدول ۵) نشان می دهد مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی شهید صدوقی یزد rs2241766

جدول ۴: تحلیل رگرسیونی ژنوتیپ‌های پلی‌مورفیسم rs2241766 با بیماری دیابت

ژنوتیپ	rs2241766	بیمار	سالم	P-value	OR (95%CI)
TT	۴۷(۶۴/۴)	۵۸(۷۶/۳)	۰/۱۱۲	(۰/۵۶-۰/۲۷-۱/۱۴)	
GG	۵(۶/۸)	۱(۱/۳)	۰/۱۲۳	(۰/۵۱-۰/۶۳-۴۸/۳۹)	
TG	۲۱(۲۸/۸)	۱۷(۲۲/۴)	۰/۳۷۱	(۰/۴۰-۰/۶۷-۲/۹۴)	
G	۳۱(۲۱/۲)	۱۹(۱۲/۵)	۰/۱۱۲	(۰/۷۸-۰/۸۷-۳/۶۴)	
T	۱۱۵(۷۸/۸)	۱۳۳(۸۷/۵)	۰/۴۳۸	(۰/۵۶-۰/۱۳-۲/۴۳)	

. با استفاده از رگرسیون لجستیک ارتباط بین خطر ابتلا به بیماری دیابت و هر یک از ژنوتیپ‌ها مورد بررسی قرار گرفت سطح معنی‌داری مقدار ۰/۰۵ در نظر گرفته شد.

جدول ۵: توزیع فراوانی ژنوتیپ‌های پلی‌مورفیسم rs2241766 در گروه‌بندی HOMA-IR

مقابل	TT	GT	Pvalue
حساس به انسولین	۵۱(۴۸/۵)	۱۸(۴۷/۳)	
مقاوم به انسولین بینابینی	۲۲(۲۱)	۱۰(۲۶/۳)	
مقاوم به انسولین	۳۲(۳۰/۵)	۱۰(۲۶/۳)	۰/۷۵۲

T2DM نشان داده شد در این مطالعات توزیع پلی‌مورفیسم rs2241766 ژن آدیپونکتین در بیماران T2DM بیشتر از گروه کنترل بود (۲۶)، حال آن که در جمعیت‌های فرانسه، ایتالیا (۲۲) و ایران (۲۸) مشابه نتایج ما هیچ ارتباطی بین این پلی‌مورفیسم و دیابت نوع ۲ مشاهده نشد (۲۶،۲۷). محققان آسیایی و اروپایی نتایج متناقضی در زمینه ارتباط ژنوتیپ‌های این پلی‌مورفیسم با بیماری دیابت گزارش کرده‌اند (۲۹). برخی محققان آلل G از پلی‌مورفیسم ژن $G>45T$ + را یک عامل مستعد برای T2DM در جمعیت آسیا معرفی کردند. حال آن که در جمعیت قفقازی بین T2DM و $G>45T$ + ارتباطی مشاهده نشده است (۳۰). در مطالعه محمدزاده فراوانی ژنوتیپ TT در بیماران دیابتی چاق بیشتر بود (۱۵) حال آن که در مطالعه پیش رو، تحلیل رگرسیونی ژنوتیپ‌های پلی‌مورفیسم rs2241766 نشان داد هیچ یک از ژنوتیپ‌ها در بیماری دیابت نقش ندارند. انسولین یک هورمون پیتیدی است که با تسهیل جذب گلوکز سلولی و تنظیم میزان متابولیسم کربوهیدرات، چربی و پروتئین، میزان گلوکز خون طبیعی را حفظ می‌کند. هیپرانسولینیمی هنگامی رخ می‌دهد که ترشح سلول‌های β پانکراس برای حفظ سطح قند خون در بافت عضلانی و بافت

بحث

در تحقیق حاضر ارتباط معنی‌داری بین پلی‌مورفیسم rs2241766 با سطح آدیپونکتین سرم، سن، نمایه توده بدنی، دور کمر، دور باسن انسولین و پروفایل لیپیدی مشاهده نشد. مطالعه در جمعیت فنلاند نیز مشابه نتایج ما بود (۲۰). در مطالعات متاناالیز ارتباط ژن آدیپونکتین و غلظت آن با دیابت نوع ۲ (۱۵) و سندروم متابولیک (۲۱،۲۲) تایید شده است. در مصر ارتباط پلی‌مورفیسم rs2241766 با سطح سرمی آدیپونکتین تأثید شده است (۱۲). Fan و همکارانش ارتباط این پلی‌مورفیسم را با افزایش خطر فشار خون گزارش کردند (۵). اما در مطالعات انجام شده در جمعیت چین ارتباطی بین این پلی‌مورفیسم باسطح پلاسمائی آدیپونکتین و فشار خون (۲۰) و دیابت بارداری گزارش نشد (۲۳). فراوانی ژنوتیپ‌های TT, GG, TG پلی‌مورفیسم rs2241766 در جمعیت مصر بین گروه‌های کنترل و بیماران مبتلا به T2DM اختلاف معنی‌داری نشان داد (۱۲) محققان چینی نیز ارتباط این پلی‌مورفیسم را با دیابت (۲۴) و کبد چرب (۲۵) گزارش کردند، همچنین در جمعیت‌های اروپا، اسپانیا، مصر، عراق (۲۶) و هند (۲۷) ارتباط پلی‌مورفیسم rs2241766 ژن آدیپونکتین با افزایش خطر

نتیجه گیری

پژوهش حاضر نشان می‌دهد بین آدیپونکتین و قند ناشتا و مقاومت به انسولین ارتباط منفی معنی دار وجود دارد، بنابراین به نظر می‌رسد آدیپونکتین هورمونی مناسب در افزایش حساسیت به انسولین در جمعیت ایران است. با توجه به نتایج، در جمعیت ما بین پلی‌مورفیسم rs 2241766 زن آدیپونکتین با دیابت نوع ۲، مقاومت به انسولین، سطح آدیپونکتین، متغیرهای بیوشیمیایی و تن‌سنجی ارتباطی وجود ندارد، لذا این پلی‌مورفیسم نمی‌تواند مارکری برای دیابت یا مقاومت به انسولین در جمعیت ما استفاده شود. پیشنهاد می‌شود بررسی دیگر پلی‌مورفیسم‌های زن آدیپونکتین در جامعه آماری با تعداد بیشتر جهت روشن شدن دقیق نقش این زن در دیابت و سایر بیماری‌های متابولیکی در جمعیت ایران انجام شود.

سپاسگزاری

مقاله حاضر برگرفته از پایان‌نامه کارشناسی ارشد است و منابع مالی آن توسط دانشجو و دانشگاه آزاد اسلامشهر تامین شده است. مراتب سپاس و قدردانی خود را از تمامی افراد شرکت‌کننده در این تحقیق، استاد بزرگوار آقای دکتر مهدی هدایتی و آقای دکتر مهران زمانی‌زاده و دوستان عزیزی که در پژوهشکده غدد و متابولیسم دانشگاه شهید بهشتی ما را باری رساندند اعلام می‌نمایم.

تعارض در منافع: وجود ندارد

چربی افزایش می‌یابد (۳۱). آدیپونکتین از طریق فسفوریلاسیون و فعال شدن پروتئین کیناز، هوموستازی گلوکز و لیپید را تنظیم می‌کند، بنابراین سطح آدیپونکتین بالا با کاهش خطر T2DM همراه است (۲۹). در تحقیق ما مشابه برخی گزارشات قبلی در جمعیت ایران ارتباط معنی دار بین آدیپونکتین و قند ناشتا و مقاومت به انسولین مشاهده شد ($p < 0.05$) (۱۰). برخی تحقیقات نشان داده است که پلی‌مورفیسم rs2241766 با مقاومت به انسولین، اختلال تحمل گلوکز و سطوح بالای لیپوپروتئین‌ها و کلسترول تام خون مرتبط است (۳۲) اما در مطالعه ما ارتباطی بین ژنتیک‌های TG و GG با پلی‌مورفیسم rs2241766 با مقاومت به انسولین مشاهده نشد. تفاوت در نتایج تحقیقات در جمعیت‌های مختلف را می‌توان به سن، جنسیت، تداخل پلی‌مورفیسم‌ها و زن‌های دیگر و حجم گروه‌های مورد بررسی نسبت داد. از ویژگی منحصر بفرد این تحقیق انتخاب بیماران دیابتی بود که سابقه مصرف داروهای متابولیکی نداشتند. در این مطالعه بین این پلی‌مورفیسم با بیماری دیابت و مقاومت به انسولین و سایر پارامترهای بیوشیمیایی و تن‌سنجی ارتباطی مشاهده نشد. با توجه به این موضوع که ارتباط یک پلی‌مورفیسم با بیماری ممکن است در جمعیت‌های مختلف به دلیل زمینه ژنتیکی و محیطی، متفاوت ظاهر کند، از این رو نتایج مشابه یا متفاوت قابل انتظار است. حجم کم نمونه از محدودیت‌های مطالعه حاضر بود که علت آن تعداد محدود افراد بدون سابقه مصرف داروی متابولیکی است.

References:

- 1-Gorgani Firouzjaeei S. *The relationship between type 2 diabetes and obesity*. J Faculty of Paramedicine. Army of the Islamic Republic of Iran 2009; 4(2): 40-4. [Persian]
- 2-Azami M, Moslemirad M, Mansouri A, Khataee M, Sayehmiri K. *The Prevalence of Depression in Patients with Diabetes in Iran*. J Babol Univ Med Sci 2017; 19(4): 16-27. [Persian]
- 3-Mohammadshahi M, Zakerzadeh M, Zakerkish M, Zarei M, Saki A. *Effects of Sesamin on the Glycemic Index, Lipid Profile, and Serum*

- Malondialdehyde Level of Patients with Type II Diabetes.** JBUMS 2016; 18(6): 7-14. [Persian]
- 4-Eazadi M, Kazemzadeh, Y, Behboody L, Banaiefar A. **Determining the relationship between serum adiponectin and insulin resistance in type 2 diabetic patients.** JBUMS 2013; 20(4): 393-400. [Persian]
- 5-Fan W, Qu X, Li J, Wang X, Bai Y4, Cao Q2, et al. **Associations between polymorphisms of the ADIPOQ gene and hypertension risk: a systematic and meta-analysis.** Sci Rep 2016; 7: 41683.
- 6-Gable DR, Hurel SJ, Humphries SE. **Adiponectin and its gene variants as risk factors for insulin resistance, the metabolic syndrome and cardiovascular disease.** Atherosclerosis 2006; 188(2): 231-44.
- 7-Rezaie F, Nezhadali M, Hedayati M. **Association of adiponectin rs17300539 gene polymorphism with a nonalcoholic fatty liver disease in an Iranian population.** Feyz, J Kashan Uni Med Sci 2018; 22(4): 379-86.
- 8-Kahn SE. **The relative contributions of insulin resistance and beta-cell dysfunction to the pathophysiology of Type 2 diabetes.** Diabetologia 2003; 46: 3-19.
- 9-Díez JJ, Iglesias P. **The role of the novel adipocyte-derived hormone adiponectin in human disease.** Eur J Endocrinol 2003; 148(3): 293-300.
- 10- Fraga VG, Gomes KB. **Adiponectin gene polymorphisms: Association with childhood obesity.** J Pediatric Genet 2014; 3: 17-28.
- 11- Takhshid MA Haem Z and Aboualizadeh F. **The association of circulating adiponectin and + 45 T/G polymorphism of adiponectin gene with gestational diabetes mellitus in Iranian population.** J Diabet Metab Disord 2015; 14(30): 1-7.
- 12- Motavi T, Salman T , Shaker O, Abdelhamid A. **Association of polymorphism in adiponectin (+45 T/G) and leptin (-2548 G/A) genes with type 2 diabetes mellitus in male Egyptians.** Arch Med Sci 2015; 11(5): 937-44.
- 13- Ranjbar SH, Amoli MM, Sajadi M, Larijani B. **Genetic association analysis of the adiponectin polymorphisms in type 2 diabetes with and without complications.** Iran J Diabetes Lipid Disorders 2011; 10: 1-4.
- 14- Hasani-Ranjbar S, Tavakkoly Bazzaz J, Amiri P, Amoli M.M, Larijani B. **Investigation of the frequency of +45T/G polymorphism of adiponectin gene in type 2 diabetic patients in a Tehranian population.** Iranian J Diabet Lipid Disorders 2007; 6 (3): 215-18.
- 15- Khodaeian M, Enayati S, Tabatabaei-Malazy O, Amoli M. **Association between Genetic Variants and DiabetesMellitus in Iranian Populations: A Systematic Review of Observational Studies.** Hindawi Publishing Corporation. J Diabetes Res 2015: 21 pages.
- 16- Sharma PK, Bhansail A,Sialy R,Malhotra S,Pandhi p. **Effects of pioglitazone and metformin on plasma adiponectin in newly detected type 2 diabetes mellitus.** Clin Endocrinol 2006; 65(6): 722-28.
- 17- Piveta VM, Bittencourt CS, Oliveira CSV, Saddi-Rosa P, Meira DM, Giuffrida FMA, et al. **Individuals with prediabetes identified by**

HbA1c undergoing coronary angiography have worse cardiometabolic profile than those identified by fasting glucose. Diabetol Metab Syndr 2014; 6: 138.

- 18- Rumi Y, Mohammad Amoli M, Hosni Ranjbar S, Ballaei P, Sajjadi MAI, Larijani B. *Investigation of the relationship between adiponectin (-11391G / A) polymorphism (-11391G / A) (+45 T / G) and waist circumference and type 1 diabetes in Iranian population.* Iran J Diabetes Lipid Disorders, August-September 2011; 1(6): 608-13.
- 19- Bahar A, Kashi Z, Sohrab M, Kosaryan M, Janbabai G. *Relationship between beta-globin gene carrier state and insulin resistance.* J Diabet Metabolic Disorder 2012; 11(22): 1-4.
- 20- Wu J, Xu G, Cai W, HuangY, Xie N , Shen Y, et al. *The association of two polymorphism in adiponectin-encoding gene with hypertension risk and the changes of circulating adiponectin and blood pressure: A meta-analysis.* oncotarget2017; 8(9): 14636-45.
- 21- Kolovou GD, Anagnostopoulou KK, Cokkinos DV. *Pathophysiology of dyslipidaemia in the metabolic syndrome.* Postgrad Med J 2005; 81(956): 358-66.
- 22- Kim DW, Kim BS, Kwon HS, Kim CG, Lee HW, Choi WH, et al. *Atrophy of brown adipocytes in the adult mouse causes transformation into white adipocyte-like cells.* Exp Mol Med 2003; 35 (6): 518-26.
- 23-Xu F, Zhang H, Qi H. *No association of adiponectin +45 T/G polymorphism with the risk of gestational diabetes mellitus: Evidence from a meta-analysis* 2016; 17(2): 1-6.
- 24- Li Y, Li X, Shi L, Yang M, Yang Y, Tao W, et al. *Association of Adiponectin SNP+45 and SNP+276 with Type 2 Diabetes in Han Chinese Populations: A Meta-Analysis of 26 Case-Control Studies.* PLoS ONE 2011; 6(5): e19686.
- 25- Du S, Lu L, Liu Y, Dong Q, Xuan S, Xin Y. *Association of Adiponectin Gene Polymorphisms With the Risk of Coronary Artery Disease in Patients With Nonalcoholic Fatty Liver Disease in a Chinese Han Population.* Hepat Mon 2016; 16(7): 1-9.
- 26- Ali Norryaa A, Qadoori AA. *Association of +45(T/G) polymorphism in the adiponectin gene with type 2 diabetes mellitus in Iraq patient international.* International journal of advanced biological research 2013; 3 (4):549-552.
- 27- Ashif CM, Balasubramanian T, Kumar P, Okais D. *A Review on Role of Cytokine Gene Polymorphisms in Type 2 Diabetes Mellitus.* Int J Pharm Sci Rev Res 2016; 39(2): 85-92.
- 28- Mohammadzadeh G, Zarghami N. *Associations between single-nucleotide polymorphisms of the adiponectin gene, serum adiponectin levels and increased risk of type 2 diabetes mellitus in Iranian obese individuals.* Scand J Clin Lab Invest 2009; 69(7): 764-71.
- 29- Yuan H, Sun L, Li X, Che F, Zhu X, Yang F, et al. *Association of Adiponectin Polymorphism with Metabolic Syndrome Risk and Adiponectin Level with Stroke Risk: A*

Meta- Analysis. *Scientific reports* 2016; 6:31945 .

30- Fan Y, Wang K, Xu S, Chen G, Di H, Cao M, et al. *Association between ADIPOQ +45T>G Polymorphism and Type 2 Diabetes: A Systematic Review and Meta-Analysis.* *Int J Mol Sci* 2015; 16: 704-23.

31- Gisela Wilcox. *Insulin and Insulin Resistance.*

Clin Biochem Rev 2005; 26: 19-39.

32- Bilovol OM, Bobronnikova LR. *Peculiarities of pathogenesis of comorbid arterial hypertension and diabetes mellitus 2 type.* *Empirical and applied research Paradigmata poznání* 2017:56-61.

Association of adiponectin gene rs2241766 polymorphism with serum adiponectin level, Insulin resistance and type 2 diabetes mellitus in an Iranian population

Nasrin Hajilo¹, Masoumeh Nezhadali*¹, Laleh Ghanei²

Original Article

Introduction: Adiponectin is a peptide secreted from fat cells that plays an important role in the development of insulin resistance and type 2 diabetes. A number of single nucleotide polymorphisms in the adiponectin gene are associated with lower adiponectin expression and T2DM. The aim of this study was to determination the frequency of rs 2241766 polymorphism in adiponectin gene and its relation with adiponectin level, insulin resistance, type 2 diabetes and in pre diabetes/diabetes and healthy individuals.

Methods: This study was performed in a case -control method. 73 prediabetic/diabetic patients with fasting blood sugar >100 mg/dl was selected as the case group without drug history, and 76 individuals with FBS 70-100 mg/dl as the control group. Biochemical and anthropometric variables were measured by standard methods and the levels of adiponectin and insulin hormone were measured using commercially available human ELISA kit. The determination of genotyping was done using PCR-RFLP method. Data were analyzed by SPSS software version 19.

Results: Regression analysis showed that polymorphism rs2241766 in the adiponectin gene has no significant relation with diabetes and insulin resistance. No significant difference was found between TT and TG carriers for any of the variables in the two groups (pre diabetes/diabetes and Non-diabetic). A negative correlation was seen between adiponectin and insulin resistance ($r=-0.225$, $p<0.01$).

Conclusion: According to this study, adiponectin gene polymorphism rs2241766 is not associated with adiponectin levels, insulin resistance and type 2diabetes, but there was a correlation between adiponectin and insulin resistance.

Keywords: Polymorphism, Diabetes Type 2, Adiponectin, Insulin resistance, rs2241766

Citation: Hajilo N, Nezhadali M², Ghanei L. Association of adiponectin gene rs2241766 polymorphism with serum adiponectin level, Insulin resistance and type 2 diabetes mellitus in an Iranian population. J Shahid Sadoughi Uni Med Sci 2019; 27(2): 1216-27.

¹Department of Biology, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran

²Faculty of Medical, Tehran Medical Branch, Islamic Azad University, Tehran,

*Corresponding author: Tel: 09123875493, email: ma_nejadali@yahoo.com