

بررسی اثر ضد میکروبی نانو ذرات نقره و ترکیب با کوتريموکسازول علیه سالمونلا تیفی در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی

مینا جوادی^۱، حسین سلطانی^۱، رسول شکری^{۲*}

مقاله پژوهشی

مقدمه: سالمونلا تیفی دسته بزرگی از باسیل های گرم منفی با خصوصیت انتروباکتریاسه و بیماری زای مشترک بین انسان و حیوان است که عامل اصلی بیماری حصیه در انسان می باشد. یکی از شایع ترین آنتی بیوتیک ها در درمان سالمونلا، کوتريموکسازول می باشد ولی به دلیل استفاده گسترده از آنتی بیوتیک ها، مقاومت باکتریایی، به وجود آمده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر ضد باکتریایی نانو ذرات نقره و ترکیب آن با آنتی بیوتیک کوتريموکسازول به منظور تولید یک داروی ضد میکروبی مؤثرتر علیه سالمونلا تیفی بود.

روش بررسی: در این مطالعه تجربی، حداقل غلظت مهار کننده رشد (MIC) و حداقل غلظت کشنده باکتری (MBC) برای نانو ذرات نقره و ترکیب با کوتريموکسازول بر اساس روش مایکرودیلوشن انجام شد. سپس اثر ضد میکروبی آنها در مدل موش آلوده بررسی شد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری نتایج حاصل، SPSS version 16 مورداستفاده قرار گرفت. در این آزمون $P < 0.05$ به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.

نتایج: MIC و MBC نانو ذرات نقره برای سالمونلا تیفی به ترتیب 4 ppm و 8 ppm ، ترکیب نانو ذرات نقره با کوتريموکسازول برای سالمونلا تیفی 62 ppm و 125 ppm و کوتريموکسازول برای سالمونلا تیفی 500 ppm و 1000 ppm بودند. مدل موشی برای بررسی اثر ضد میکروبی نانو ذرات نقره علیه عفونت سالمونلا تیفی تأیید شد. به طوری که نانو ذرات نقره بیشترین اثر ضد میکروبی و کوتريموکسازول کمترین اثر ضد میکروبی نسبت به سایر گروه ها داشتند.

نتیجه گیری: نانو ذرات نقره در مقایسه با سایر گروه ها به ویژه کوتريموکسازول آنتی باکتریایی بسیار مؤثری است.

واژه های کلیدی: سالمونلا تیفی، نانو ذرات نقره، کوتريموکسازول، اثر ضد میکروبی

ارجاع: جوادی مینا، سلطانی حسین، شکری رسول. بررسی اثر ضد میکروبی نانو ذرات نقره و ترکیب با کوتريموکسازول علیه سالمونلا تیفی در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ۱۴۰۲؛ ۳۱ (۵): ۶۶۷۵-۸۲.

۱- دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، زنجان، ایران.

۲- گروه میکروب شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

* (نویسنده مسئول)؛ تلفن: ۰۹۱۲۷۴۲۵۰۳۴، پست الکترونیکی: rsh.bio42@gmail.com، صندوق پستی: ۴۵۱۵۶۵۸۱۴۵

مقدمه

مولکولی حاوی گوگرد و فسفر موجود در غشا و درون سلول باکتری، میل ترکیبی دارند. این نانو ذرات یون‌های نقره را آزاد می‌کنند و به انتقال الکترون غشایی آسیب می‌رسانند و از تکثیر DNA جلوگیری می‌کنند (۷). با توجه به اینکه اثرات ضد میکروبی نانو ذرات نقره بر روی باکتری‌های مختلف تأیید شده است، مطالعه حاضر با هدف سنجش میزان فعالیت نانو ذرات نقره به عنوان روش جدید مقابله با بیماری‌زایی حاصل از باکتری سالمونلا تیفی در شرایط آزمایشگاهی و در مدل حیوانی انجام شد. با توجه به اینکه اثرات ضد میکروبی نانو ذرات نقره بر روی باکتری‌های مختلف تأیید شده است، مطالعه حاضر با هدف سنجش میزان فعالیت نانو ذرات نقره به عنوان روش جدید مقابله با بیماری‌زایی حاصل از باکتری سالمونلا تیفی در شرایط آزمایشگاهی و در مدل حیوانی انجام شد.

روش بررسی

در این مطالعه تجربی، سویه سالمونلا تیفی PTCC 1609 از آزمایشگاه میکروبیولوژی انسستیتو پاستور تهیه شده بود. نانو ذرات نقره با غلظت ۰.۴۰۰۰ ppm، به قطر ۲۰ nm با نام تجاری NANO NASB PARS از شرکت NANOCOLLOID گردید. موش‌های سوری ماده شش الی هشت هفت‌های (با وزن تقریبی ۲۵±۵ گرم) از موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی کرج خریداری شدند. ابتدا برای تهیه سوسپانسیون میکروبی در شرایط استریل، از کلنی‌های تک رشد کرده با استفاده از لوب استریل وارد ۱۰ میلی لیتر سرم فیزیولوژی گردیده و به مدت ۱۰ دقیقه ورتسک شد. سپس جهت تایید غلظت نهایی سوسپانسیون مورد نظر به $CFU/ml \times 10^8$ کلنی در هر میلی لیتر معادل نیم مک فارلند، میزان جذب نوری سوسپانسیون میکروبی توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر در طول موج ۶۲۰ نانومتر تعیین گردید (۸). برای تعیین حساسیت سالمونلا تیفی به آنتی‌بیوتیک‌ها از روش دیسک دیفیوژن استفاده شد. سوسپانسیون میکروبی (معادل نیم مک فارلند) تهیه شده بر روی محیط کشت حاوی مولر هینتون آگار (از شرکت MERCK محصول کشور آلمان) کشت داده شد، سپس دیسک‌های آنتی‌بیوتیکی بر روی محیط کشت قرار داده شد. جهت انجام

سالمونلا تیفی یک باکتری گرم منفی و مسئول تب حصبه که یک بیماری خاص برای انسان است. حصبه یک بیماری حاد است که اغلب با تب بالا، کسالت و درد شکمی مشخص می‌شود. در سطح جهانی، کودکان به‌طور نامتناسبی تحت تأثیر قرار می‌گیرند، به ویژه در جنوب آسیای مرکزی، آسیای جنوب شرقی، آمریکای لاتین و جنوب آفریقا، جایی که بروز مقاومت آنتی‌بیوتیکی باعث تشدید عوارض و مرگ‌ومیر مرتبط با این بیماری می‌شود. عوارض جدی شامل سوراخ شدن روده، سپتی سمی و منژیت است که بیشترین میزان بروز این موارد در کودکان و بیماران نقص ایمنی دیده می‌شود. این عوارض تهدیدکننده زندگی هستند و به مراقبت‌های پزشکی پیشرفت نیاز دارند که اغلب در مناطق آندمیک تیفوئید در دسترس نیست (۱،۲). سالمونلا تیفی با نفوذ مستقیم به بافت اپیتلیال به واسطه تنظیم‌کننده هدایت غشایی گذرنده سیستیک فیبروزیس (CFTR) یا از طریق سلول M، یک سلول اپیتلیال لنفوئیدی تخصصی، وارد ناحیه زیر مخاطی روده کوچک می‌شود. هنگامی که این باکتری وارد زیر مخاطی می‌شود، باعث هیپرتروفی لکه‌های پیر می‌شود (۳،۴،۵). با پیشرفت بیماری، بیمار ممکن است دچار گیجی متناوب و یک بیحالی خاصی شود. با اینحال، درد شکمی در همه بیماران دیده می‌شود و می‌تواند از ماهیت منتشر تا دردی که شبیه آپاندیسیت است، متغیر باشد. بزرگ شدن کبد و طحال معمولاً در طول پیشرفت بیماری ایجاد می‌شوند (۳،۴). در تب روده‌ای و باکتریمی، آنتی‌بیوتیک‌ها نقش بسیار مهمی در درمان دارند. فلوروکینولون‌ها، کلرامفینیکل، آموکسیسیلین، آمپسیلین، کوتربیوموکسازول و سفالوسپورین‌های نسل سوم، آنتی‌بیوتیک‌های مؤثری در درمان تیفوئید هستند. گونه‌های سالمونلا این توانایی را دارند که از راههای مختلف، مقاومت‌های آنتی‌بیوتیکی را کسب نمایند (۶). نقره، فلزی است که به دلیل طیف وسیع فعالیت خود در برابر باکتری‌ها، قارچ‌ها و برخی وپروس‌ها شناخته می‌شود و در قالب نانو ذرات خواص آن به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. نانو ذرات نقره با گروههای

از ۲۴ ساعت، چاهکها از نظر کدورت ناشی از رشد باکتری تلقیح شده مورد بررسی شدند و اولین غلظتی که در آن هیچ‌گونه کدورتی قابل تشخیص نبود به عنوان MIC در نظر گرفته شد. در پایان از تمامی چاهکها که در آن‌ها رشد مشاهده نشد به مقدار یک لوپ در پلیت حاوی محیط کشت مولر هینتون آگار کشت داده شد و پلیت‌ها به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد انکوبه شدند. بعد از ۲۴ ساعت، پلیت حاوی کمترین غلظت از آنتی‌بیوتیک کوتیریموکسازول بودند که در آن عدم رشد باکتری مشاهده گردید، به عنوان MBC در نظر گرفته شد. تمامی مراحل این روش با سه بار تکرار انجام گردید (۱۰). ب) بررسی اثر نانو ذرات نقره بر روی باکتری سالمونولا تیفی در این مرحله، تمامی مراحل همانند روش فوق انجام گرفت. در نهایت، دو مورد از چاهک‌ها، یکی حاوی محیط کشت و نانو ذرات نقره به عنوان شاهد منفی و دیگری حاوی محیط کشت و سوسپانسیون میکروبی به عنوان شاهد مثبت در نظر گرفته شدند. تمامی مراحل این روش با سه بار تکرار انجام گردید (۱۰). پ) بررسی اثر نانو ذرات نقره و آنتی‌بیوتیک کوتیریموکسازول (به صورت ترکیبی) بر روی سالمونولا تیفی در این مرحله، به هر کدام از چاهک‌ها ۵۰ میکرولیتر از رقت‌های تهیه شده از کوتیریموکسازول و ۵۰ میکرولیتر از رقت‌های مختلف نانو ذره نقره اضافه شد در ادامه تمامی مراحل همانند روش فوق انجام گرفت که در نهایت دو مورد از چاهک‌ها، یکی حاوی محیط کشت و نانو ذرات نقره و آنتی‌بیوتیک کوتیریموکسازول (به صورت ترکیبی) به عنوان شاهد منفی و دیگری حاوی محیط کشت و سوسپانسیون میکروبی به عنوان شاهد مثبت در نظر گرفته شد. تمامی مراحل این روش با سه بار تکرار انجام گردید (۱۰). در مدل حیوانی، از موش‌های سوری ماده شش الی هشت‌هفت‌های (با وزن تقریبی 25 ± 5 گرم) استفاده شد. ۱۵ سر موش سوری به ۵ گروه سه‌تایی که شامل: گروه اول، اثر ضد میکروبی با آنتی‌بیوتیک کوتیریموکسازول. گروه دوم، اثر ضد میکروبی با نانوذره نقره. گروه سوم، اثر ضد میکروبی با ترکیب کوتیریموکسازول و نانو ذرات نقره (به صورت ترکیبی). گروه چهارم، به عنوان شاهد مثبت و گروه پنجم، به عنوان شاهد

روش دیسک دیفیوژن، از دیسک‌های (از شرکت بهنوزن محصول کشور ایران) تتراسایکلین (TE30) - کلامفیکل (C30) - سیپروفلوکسازین (CP5) - جنتامایسین (GM10) - ایمی‌پنم (IPM10) - سفالوتین (CF30) - سفتازیدیم (CAZ30) - کوتیریموکسازول (SXT) - آمپی‌سیلین (AM10) و آمیکاسین (AN30) استفاده شد. در نهایت طبق دستورالعمل کمیته ملی استانداردهای آزمایشگاه بالینی (CLSI)، نتایج به صورت حساس، نیمه حساس و مقاوم گزارش گردید (۹). نانو ذرات نقره، کوتیریموکسازول و ترکیب آن‌ها در آب مقطر دیونیزه در میکرو تیوب‌های استریل تهیه گردید. به منظور تعیین حداقل غلظت مهارکننده رشد (MIC) و حداقل غلظت کشنده باکتری (MBC) از روش مایکرودیلوشن (رقت در براث) در سه مرحله جدا، به شرح زیر استفاده گردید:

الف) بررسی اثر کوتیریموکسازول بر باکتری سالمونولا تیفی در این مرحله با توجه به تهیه نانو ذرات نقره با غلظت ppm ۱، ۲، ۴، ۸، ۱۶، ۳۱، ۶۲ از کوتیریموکسازول به روش رقت سازی سریال تهیه شدند. ابتدا پودر کوتیریموکسازول را با سرم فیزیولوژی توسط دستگاه ورتسکس مخلوط کرده تا به غلظت مورد نیاز رسانده شود سپس به مقدار ۱۰۰ میکرولیتر از محیط کشت آمده مولر هینتون براث داخل ۱۵ چاهک مورد نظر از میکروپلیت ۹۶ خانه‌ای ریخته شد در ادامه به اولین چاهک ۱۰۰ میکرولیتر از کوتیریموکسازول با غلظت ۴۰۰۰ ppm اضافه شد سپس از چاهک اول ۱۰۰ میکرولیتر محلول برداشته و به چاهک دوم اضافه گردید. این روند تا چاهک سیزدهم انجام شد تا تمامی غلظت‌های مورد نظر ساخته شوند. در نهایت به همه چاهک‌های مورد نظر ۱۰ میکرولیتر سوسپانسیون میکروبی با غلظت 5×10^5 CFU/ml اضافه گردید. در ضمن دو مورد از چاهک‌ها، یکی حاوی محیط کشت و کوتیریموکسازول به عنوان کنترل منفی و دیگری حاوی محیط کشت و سوسپانسیون میکروبی به عنوان کنترل مثبت در نظر گرفته شدند. در آخر میکروپلیت به مدت ۲۰ دقیقه در انکوباتور شیکردار قرار داده شد و پس از آن به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد انکوبه گردید. بعد

ملاحظات اخلاقی

پروپوزال این تحقیق توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان تایید شده است.

نتایج

یافته‌های مطالعه حاضر نشان می‌دهد که نتایج حاصل از تست دیسک دیفیوژن برای تعیین حساسیت آنتی‌بیوتیکی سویه سالمونلا تیفی با روش انتشار دیسک طبق جدول استانداردهای آزمایشگاه بالینی (CLSI) نسبت به ۱۰ آنتی‌بیوتیک در جدول ۱ نشان داده شده است. آنتی‌بیوتیک کوتربیوموکسازول به دلیل در دسترس بودن انتخاب شد. نتایج به دست آمده از تعیین MIC و MBC با روش مایکرودیلوشن در جدول ۲ نشان داده شده است که در غلظت‌های ۴۰۰۰ ppm از نانو ذرات نقره، کوتربیوموکسازول و ترکیب آن‌ها در محیط مولر هینتون آگار انجام گردید. در مدل حیوانی، آنالیز آماری نتایج مربوط به بررسی اثر ضد میکروبی نانو ذرات نقره، آنتی‌بیوتیک کوتربیوموکسازول و اثر ترکیبی آن‌ها بر روی سالمونلا تیفی در موش‌های سوری ماده در جدول ۳ نشان داده شده است؛ که اختلاف معنی‌داری در بین گروه‌های تیماری مورد مطالعه وجود دارد ($P < 0.05$) یعنی هر سه دارو اثر ضد میکروبی متفاوتی بر روی سالمونلا تیفی دارد.

منفی تقسیم شدند. برای ایجاد عفونت تجربی در موش‌های انتخابی، سوسپانسیون باکتریایی با غلظت 10^5 CFU/ml در شرایط استریل به مقدار ۱۰۰ میکرولیتر به صورت داخل صفاقی به همه گروه‌های مورد نظر به غیر از گروه شاهد منفی تزریق شد و ۲۴ ساعت به موش‌ها فرصت ایجاد عفونت داده شد. در روز دوم، مقدار ۱۰۰ میکرولیتر از آنتی‌بیوتیک کوتربیوموکسازول با غلظت ۲ میکروگرم بر میلی‌لیتر به موش‌های گروه اول، مقدار MBC ۱۰۰ میکرولیتر از نانو ذرات نقره معادل با غلظت MBC مشخص شده به موش‌های گروه دوم، مقدار ۱۰۰ میکرولیتر از ترکیب آنتی‌بیوتیک کوتربیوموکسازول و نانو ذرات نقره (به صورت ترکیبی) معادل با غلظت MBC مشخص شده به موش‌های گروه سوم به صورت درون صفاقی تزریق شد. بعد از گذشت هفت شبانه روز دوره درمان، هر یک از موش‌ها در دسیکاتور حاوی اتر کشته شدند و طحال موش‌ها در شرایط استریل خارج گردیده و در ۱۰۰۰ میکرولیتر بافر فسفات سالین هموژنیزه گردیدند، سپس از سوسپانسیون هموژنیزه طحالی، با پورپلیت کردن بر روی محیط مولر هینتون آگار کشت داده شد و در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد به مدت ۲۴ ساعت انکوبه شدند که در نهایت شمارش کلی‌های سالمونلا تیفی با استفاده از شمارش گر کلی انجام گردید (۱۱).

تجزیه و تحلیل آماری

به منظور تجزیه و تحلیل آماری نتایج حاصل، نرم‌افزار SPSS version 16 مورد استفاده قرار گرفت. در این آزمون $P < 0.05$ به عنوان سطح معنی‌داری در نظر گرفته شد.

جدول ۱: میزان مقاومت و حساسیت آنتی‌بیوتیک‌ها بر روی سالمونلا تیفی

نام آنتی‌بیوتیک تتراسایکلین	نتیجه نیمه حساس	بر حسب میلی‌متر
حساس	حساس	۲۱
حساس	حساس	۳۲
حساس	حساس	۱۷
نیمه حساس	نیمه حساس	۲۱
حساس	حساس	۲۳
نیمه حساس	نیمه حساس	۱۹
حساس	حساس	۳۴
حساس	حساس	۱۸
حساس	حساس	۲۳

جدول ۲: میزان MIC و MBC نانو ذرات نقره و کوتريموکسازول و اثرات ترکیبی آنها بر روی سالمونلا تیفی

MBC	MIC	غلهٔت
۱۰۰۰ ppm	۵۰۰ ppm	کوتريموکسازول
۸ ppm	۴ ppm	نانو ذرات نقره
۱۲۵ ppm	۶۲ ppm	نانو ذرات نقره و کوتريموکسازول

حداقل غلهٔت مهارکننده رشد (MIC)، حداقل غلهٔت کشنده باکتری (MBC)

جدول ۳: میانگین و انحراف معیار شمارش کلی و اثر مهاری نانو ذرات نقره و کوتريموکسازول و اثرات ترکیبی آنها بر روی موش‌های سوری آلوده به سالمونلا تیفی

نتایج	شمارش کلی (cfu/ml)
کوتريموکسازول	۲۶۶۰±۳۴۶/۰۹
نانو ذرات نقره	۴۱۱±۵۳/۴۷
نانو ذرات نقره و کوتريموکسازول	۱۷۷۳±۲۳۰/۶۸
کنترل مثبت	۲۶۶۰±۳۴۸/۶۶

نقره به تنها یی بسیار مؤثرتر از سایر گروه‌ها بهویژه آنتی‌بیوتیک کوتريموکسازول است. ترکیب نانو ذرات نقره با آنتی‌بیوتیک کوتريموکسازول نیز اثر هم‌افزایی چشمگیری نسبت به خود آنتی‌بیوتیک داشته و لی نمی‌تواند جای نانو ذرات نقره را بگیرند ولی می‌توان با استفاده از آن، میزان استفاده از ضد میکروبی کاهش داد. در مطالعه حاضر نتایج تعیین MIC و MBC به روش مایکرودایلوشن نشان داد که نانو ذرات نقره نسبت به هر کدام از عوامل به تنها یی، دارای خاصیت ضد میکروبی بیشتری بر روی سالمونلا تیفی می‌باشد. این یافته‌ها با نتایج حاصل از سایر پژوهشگران مورد برسی قرار گرفت. هومبرتو و همکارانش (Humberto et al) در سال ۲۰۱۰ در مکزیک اثر مهاری نانو ذرات نقره را بر روی باکتری‌هایی که مقاومت داروبی زیادی از خود نشان می‌دهند مثل باکتری‌های سودوموناس آئروژینوزا، اشرشیاکلی مقاوم به آمپی‌سیلین، استرپتوکوکوس پایوژن مقاوم به اریتروماستیکین را نشان دادند آن‌ها مشاهده کردند که نانو ذرات نقره اثر باکتری‌ستاتیک قابل ملاحظه‌ای بر روی این باکتری‌ها دارند (۱۲). در سال ۲۰۰۹ نیلدا و همکارانش (Nilda et al) توانستند باکتری استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین را با استفاده از نانو ذرات نقره مهار نمایند. آن‌ها ثابت کردند فلز نقره در حالت نانو بودن اثر ضد میکروبی می‌تواند داشته باشد

بحث

تب حصبه یا تب روده عمدتاً توسط سالمونلا تیفی ایجاد می‌شود. حصبه بیشتر از طریق خوردن آب یا غذای آلوده منتقل می‌شود. پس از ورود به روده کوچک، باکتری‌ها از سد اپیتیال روده عبور کرده و توسط ماکروفائزها فاگوسیتوز می‌شوند و به صورت سیستمیک پخش می‌شوند و بیماری حاد ایجاد می‌کنند. شایع‌ترین محل‌های عفونت ایلئوم، کبد، طحال، مغز استخوان و کیسه صفراء هستند. باکتری‌ها از طریق عروق یا مجرای که از کبد خارج می‌شوند به کیسه صفراء می‌رسند. در طول دهه گذشته، بروز مقاومت آنتی‌بیوتیکی در بین گونه‌های سالمونلا تیفی به‌طور چشمگیری در مناطق آندمیک افزایش یافته است. سویه‌هایی که تقریباً در برابر هر آنتی‌بیوتیک خط اول موجود مقاوم هستند، بازیابی شده‌اند و تا ۶۰ درصد از همه سویه‌های جداسده مقاومت چند داروبی را نشان می‌دهند (۱، ۲). با توجه به اهمیت این موضوع به‌نظر می‌رسد که ترکیبات آنتی‌بیوتیکی همراه با نانو ذرات فلزی جایگزین مناسبی برای این آنتی‌بیوتیک‌ها باشند. ولی تاکنون مطالعه چندانی بر روی اثر ضد میکروبی نانو ذرات نقره و اثر ترکیبی آن‌ها با آنتی‌بیوتیک کوتريموکسازول علیه عفونت ناشی از سالمونلا تیفی، به خصوص در مدل حیوانی نشده است. بر اساس مطالعه حاضر، اثر نانو ذرات

همکاران (Alizadeh et al), در سال ۲۰۱۱ اثر همافزایی نانو ذرات نقره با جنتامایسین را در مدل حیوان مورد بررسی قرار دادند. آن‌ها در این مطالعه آنتی‌بیوتیک جنتامایسین را به نانو ذرات نقره به صورت توأم در مدل حیوانی مورد آزمایش قرار دادند. نتایج آن‌ها نشان داد که نانو ذرات نقره اثر همافزایی دادند. شدیدی با جنتامایسین دارد (۱۱). همچنین آرونا (Aruna) در سال ۲۰۱۱ خواص ضد باکتریایی نانو ذرات بر روی باکتری مقاوم سودوموناس آئروژینوزا بررسی و نتایج ضد باکتریایی نانو ذرات نقره گزارش نمود، این بررسی‌هایی که بر روی باکتری سودوموناس آئروژینوزا در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی انجام گرفته شد، مطابقت دارد (۱۶). نتایج حاصل از اثر ضد میکروبی نانو ذرات نقره و ترکیب با کوتربیوموکسازول در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی با نتایج این پژوهشگران مطابقت داشت.

نتیجه‌گیری

نانو ذرات نقره به تنها یابی بسیار مؤثرتر از سایر گروه‌ها به ویژه آنتی‌بیوتیک کوتربیوموکسازول است. اثر ترکیبی نانو ذرات نقره با کوتربیوموکسازول تا حدی با اثر نانو ذرات نقره برابر بوده است و کاهش میزان رشد در این دو ماده بالا می‌باشد ولی جایگزین مناسبی در برابر نانو ذرات نقره نمی‌باشد. نانو ذرات نقره می‌تواند در آینده به عنوان عامل ضد میکروبی استفاده شده و تا میزان قابل قبولی رشد باکتری‌ها را کنترل نمود.

سپاس‌گزاری

این مطالعه ماحصل بخشی از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی زنجان بوده بدین‌وسیله از زحمات مسئولیت محترم مرکز تحقیقات بیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان تشکر و قدردانی به عمل می‌آید.

حامي مالي: ندارد.

تعارض در منافع: وجود ندارد.

(۱۳). همچنین در مطالعات بهروان و همکارانش (Behravan et al), در سال ۲۰۱۹ فعالیت ضد میکروبی نانو ذرات نقره بر استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج به دست آمده نشان داد اثر ضد میکروبی نانو ذرات نقره بر باکتری‌های گرم منفی بیشتر از باکتری‌های گرم مثبت بود که با افزایش غلظت و تعداد نانو ذرات، مهار کامل رشد باکتری اتفاق افتاد. در باکتری گرم منفی اشرشیاکلی نانو ذرات نقره مانع از جذب و آزاد شدن فسفات، مانیتول، پرولین، گلوتامین و سوکسینات از سلول این باکتری می‌شوند تمایل زیاد ذرات نقره به گوگرد و فسفر در غشای سلولی دلیل اصلی خاصیت ضد باکتریایی آن است. نانو ذرات نقره با پروتئین‌های حاوی گوگرد در داخل یا خارج غشای سلول و اکنش می‌دهند که بر بقای سلول‌ها تأثیر می‌گذارد (۱۴). نتایج مطالعه حاضر بر روی مدل حیوانی نشان می‌دهد که نانو ذرات نقره در موش‌های سوری ماده می‌تواند آثار ضد میکروبی خود را بر روی عفونت ناشی از سالمونلا تیفی حفظ کرده و به تنها یابی دارای اثر ضد میکروبی می‌باشد. همچنین آنالیز آماری نتایج مدل حیوانی نشان داد که نانو ذرات نقره دارای خاصیت ضد میکروبی بیشتری علیه عفونت‌های حاصل از سالمونلا تیفی نسبت به آنتی‌بیوتیک کوتربیوموکسازول می‌باشد. با افزایش غلظت نانو ذرات نقره، رشد میکروب کاهش یافته است لذا می‌توان گفت که اثر نانو ذرات نقره وابسته به دوز مصرفی است و با افزایش غلظت آن اثر ضد میکروبی آن نیز افزایش می‌یابد. در مطالعه حاضر با مقایسه نتایج مربوط به مدل حیوانی، مشخص شد تأثیر ضد میکروبی بین گروه‌های تیماری با نانو ذرات نقره، آنتی‌بیوتیک کوتربیوموکسازول و نانو ذرات نقره و آنتی‌بیوتیک کوتربیوموکسازول (به صورت ترکیبی)، اختلاف معنی‌داری بود. یافته‌های به دست آمده در این مطالعه با نتایج سلیم و همکارانش (Seleem et al), در سال ۲۰۰۹ مطابقت دارد. آن‌ها در مطالعه نشان دادند که تعداد کلی‌های باکتری سالمونلا انتریکا در طحال و کبد موش در صورت تزریق نانو ذرات سیلیکا کونشوگه شده با جنتامایسین در مقایسه با زمانی که تنها جنتامایسین آزاد به طحال و کبد موش تزریق می‌شود، کمتر است (۱۵). در مطالعه‌ای دیگر علیزاده و

References:

- 1-**Levine MM, Black RE, Lanata C. *Precise Estimation of the Numbers of Chronic Carriers of Salmonella Typhi in Santiago, Chile, an Endemic Area.* J Infect Dis 1982; 146(6): 724-6.
- 2-**Merselis JG Jr, Kaye D, Connolly CS, Hook EW. *Quantitative Bacteriology of the Typhoid Carrier State.* Am J Trop Med Hyg 1964; 13: 425- 9.
- 3-**Crump JA, Sjölund-Karlsson M, Gordon MA, Parry CM. *Epidemiology, Clinical Presentation, Laboratory Diagnosis, Antimicrobial Resistance, and Antimicrobial Management of Invasive Salmonella Infections.* Clin Microbiol Rev 2015; 28(4): 901-37.
- 4-** Parry CM, Hien TT, Dougan G, White NJ, Farrar JJ. *Typhoid Fever.* N Engl J Med 2002; 347(22): 1770-82.
- 5-** Gebert A, Rothkötter HJ, Pabst R. *M Cells in Peyer's Patches of the Intestine.* Int Rev Cytol 1996; 167: 91-159.
- 6-** Forbes BA, Sahm DF, Weissfeld AS. *Baily and Scott's Diagnostic Microbiology.* 12th ed. Mosby; 2007. p. 323-34.
- 7-**Das Neves PB, Agnelli JA, Kurachi C, de Souza CW. *Addition of Silver Nanoparticles to Composite Resin: Effect on Physical and Bactericidal Properties in Vitro.* Braz Dent J 2014; 25(2): 141-5.
- 8-**Ranković BR, Kosanić M. *Antimicrobial Activities of Different Extracts of Lecanora Atra Lecanora Muralis, Parmelia Saxatilis, Parmelia Sulcata and Parmeliopsis Ambigua.* PJB 2012; 44(1): 429-433.
- 9-**Melvin P, James S, April M, Sharon K, Marcelo F, Romney M, Et al. *Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing.* M100, 30th ed. Wayne: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2020: 156-170.
- 10-**Nasiri Semnani Sh, Rahnama M, Ghasempour H, Alizadeh H. *Evaluation of Antibacterial Effects of Lecanora Muralis SP. Extract on Staphylococcus Aureus and Salmonella Typhimurum in Vitro and in Animal Model.* JABS 2014; 4(3): 318-26. [Persian]
- 11-**Alizadeh H, Salouti M, Shapouri R, Abdollazadeh P, Nasseryan J. *Antibacterial Effects of Silver Nanoparticles on Brucella Melitensis 16M in an Animal Model in Vitro.* J Arak Uni Med Sci 2012; 14(7): 64-70. [Persian]
- 12-**Lara HH, Ayala-Núñez NV, Ixtepan Turrent LD, Rodríguez Padilla C. *Bacterisidal Effect of Silver Nanoparticles against Multidrug-Resistant Bacteria.* World journal of microbiology & biotechnology 2010; 26(4): 615-21.
- 13-**Ayala-Nunez NV, Lara Villegas HH, Del Carmen Ixtepan Turrent L, Rodriguez-Padilla C. *Silver Nanoparticles Toxicity and Bacterial Effect agaiens Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus:* Nanoscale Does Matter. Nanobiotechnol 2009; 5(1): 2-9.
- 14-**Behravan M, Panahi AH, Naghizadeh A, Ziae M, Mahdavi R, Mirzapour A. (2019). *Facile Green Synthesis of Silver Nanoparticles Using Berberis Vulgaris Leaf and Root Aqueous Extract and its Antibacterial Activity.* International Journal of Biological Macromolecules 2019; 124: 148-54. [Persian]
- 15-**Seleem MN, Munusamy P, Ranjan A, Alqublan H, Pickrell G, Sriranganathan N. *Silica-Antibiotic Hybrid Nanoparticles for Targeting Intracellular Pathogens.* Antimicrob Agents Chemother 2009; 53(10): 4270-4.
- 16-**Kora AJ, Arunachalam J. *Assessment of Antibacterial Activity of Silver Nanoparticles on Pseudomonas Aeruginosa and its Mechanism of Action.* World J Microbiol Biotechnol 2011; 27: 1209-16.

Antimicrobial Effect of Silver Nanoparticles and Combination with Cotrimoxazole against *Salmonella Typhi* in Vitro and in Animal Model

Mina Javadi¹, Hossein Soltani¹, Rasoul Shokri^{*2}

Original Article

Introduction: *Salmonella typhi* is a large group of gram-negative bacilli with Enterobacteriaceae and common pathogens between humans and animals, which is the main cause of typhoid fever in humans. One of the most common antibiotics in the treatment of *Salmonella* is cotrimoxazole, but due to the widespread use of antibiotics, bacterial resistance has developed. The aim of this study was to investigate the antibacterial effect of silver nanoparticles and its combination with the antibiotic cotrimoxazole to produce a more effective antimicrobial drug against *Salmonelltyphi*.

Methods: In this experimental study, the minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) for silver nanoparticles and combination with cotrimoxazole, was performed based on microdilution method. Then, their antibacterial effects were investigated in infected mouse model. In order to analyze the results statistically, SPSS software version 16 was used. In this test, $P < 0.05$ was considered as a significant level.

Results: MIC and MFC of silver nanoparticles for *Salmonella typhi* were 4 ppm and 8 ppm respectively, composition of silver nanoparticles with cotrimoxazole for *Salmonella typhi* were 62 ppm and 125 ppm and cotrimoxazole for *Salmonella typhi* were 500 ppm and 1000 ppm. Mouse model to study the antibacterial effect of silver nanoparticles and combination with cotrimoxazole against *Salmonella typhi* infection was confirmed., Silver nanoparticles had the highest antibacterial effect and cotrimoxazole has the lowest antibacterial effect than other groups.

Conclusion: Silver nanoparticles are very effective compared to other groups, especially the antibacterial cotrimoxazole.

Keywords: *Salmonella typhi*, Silver nanoparticles, Cotrimoxazole, Antimicrobial effect.

Citation: Javadi M, Soltani H, Shokri R. **Antimicrobial Effect of Silver Nanoparticles and Combination with Cotrimoxazole against *Salmonella Typhi* in Vitro and in Animal Model.** J Shahid Sadoughi Uni Med Sci 2023; 31(5): 6675-82.

¹Faculty of Sciences, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.

²Department of Microbiology, Faculty of Science, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.

*Corresponding author: Tel: 09127425034, email: rsh.bio42@gmail.com