

# تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی پرشدت (HIIT) بر محتواهای پروتئین‌های شکافت و همجوشی میتوکندری در بطن چپ رت‌های پیر

مهدي مارزلو<sup>۱</sup>، ندا آقايي بهمن‌بگلو<sup>\*۱</sup>، حامد عليزاده پهلواني<sup>۲</sup>، حبيب اصغرپور<sup>۱</sup>

## مقاله پژوهشی

**مقدمه:** با افزایش سن افراد، خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی‌عروقی به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد. امروزه تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) به عنوان یک روش فعالیت ورزشی برای بهبود بیماری قلبی مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین هدف از تحقیق حاضر تاثیر هشت هفته HIIT بر محتواهای پروتئین‌های PINK1 و PARKIN در بطن چپ رت‌های پیر می‌باشد.

**روش بررسی:** پژوهش حاضر از نوع تجربی است، که با ۱۲ سرعت نر ۲۰ ماهه با میانگین وزنی  $۴۰.۰ \pm ۳.۰$  گرم انجام شد. رت‌ها به‌طور تصادفی به دو گروه HIIT و کنترل (هر گروه ۶ سر) تقسیم شدند. برنامه HIIT با دوره‌های پرشدت ۸۵-۹۵ درصد سرعت بیشینه (متر بر دقیقه) و دوره‌های استراحت فعال با شدت ۴۰-۵۵ درصد سرعت بیشینه (متر بر دقیقه) برای هر جلسه در هفته بود. پس از ۴۸ ساعت از آخرین جلسه تمرین، رت‌ها تحت تزریق کتابیون و زایلازین بی‌هوش شدند و بطن چپ قلب برداشته شد و از طریق روش آزمایشگاهی وسترن‌بلات متغیرها اندازه‌گیری شدند. داده‌ها از طریق آزمون آماری شاپیرو-ولیک و t-مستقل در نرم‌افزار SPSS version 16 و تحلیل شدند. سطح معناداری  $\leq 0.05$  P در نظر گرفته شد.

**نتایج:** هشت هفته HIIT سبب افزایش معنی‌دار پروتئین‌های PINK1 ( $p < 0.02$ ) و PARKIN ( $p < 0.04$ ) نسبت به گروه کنترل در بطن چپ رت‌های پیر شد.

**نتیجه‌گیری:** به‌نظر می‌رسد HIIT قابلیت کنترل کیفیت میتوکندری در بطن چپ قلب رت‌های پیر را دارد که می‌تواند برای بخش سلامت در نظر گفته شود..

**واژه‌های کلیدی:** تمرین تناوبی با شدت بالا، بطن چپ، پروتئین PINK1، پروتئین PARKIN

**ارجاع:** مارزلو مهدی، آقایی بهمن‌بگلو ندا، عليزاده پهلوانی حامد، اصغرپور حبيب. تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی پرشدت (HIIT) بر محتواهای پروتئین‌های شکافت و همجوشی میتوکندری در بطن چپ رت‌های پیر. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی بیزد ۱۴۰۳؛ ۳۲(۱۰): ۸۳۱۸-۲۹.

۱- گروه تربیت بدنسport و علوم ورزشی، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران.

۲- گروه آموزش تربیت بدنسport، دانشگاه فرهنگیان، صندوق پستی ۱۴۶۶۵-۸۸۹ تهران، ایران.

(نویسنده مسئول): تلفن: ۰۹۱۹۱۹۹۲۹۹۶، پست الکترونیکی: nedaaghaei@aliabadiu.ac.ir، صندوق پستی: ۴۹۴۱۷۹۳۴۵۱

## مقدمه

با افزایش سن افراد، خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی‌عروقی به‌طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. تغییرات مربوط به سن در ساختار و عملکرد قلب، از جمله هیپرتروفی بطن چپ و کاهش انقباض، به خوبی مستند شده است (۱). بطن چپ نقش محوری در حفظ گردش خون سیستمیک ایفا می‌کند و عملکرد آن اغلب با افزایش سن به خطر می‌افتد و منجر به شرایطی مانند نارسایی قلبی می‌شود (۲,۳). در سلول‌های قلبی (کاردیومیوسمیت‌ها) میتوکندری‌ها برای تولید انرژی حیاتی هستند. میتوکندری ناکارآمد می‌تواند منجر به افزایش استرس اکسیداتیو و آپوپتوز شود که به بیماری قلبی کمک می‌کند (۴). در این راستا، دو پروتئین کیناز ۱ ناشی از PTEN (PINK1) و پروتئین PARKIN-induced kinase با هم برای تنظیم میتوفاژی کار می‌کنند و تخریب انتخابی میتوکندری‌های آسیب‌دیده را اعمال می‌کنند (۱,۳,۵). همچنین PINK1 و PARKIN برای حفظ یکپارچگی میتوکندری ضروری هستند و نقش آنها با اختلالات قلبی مختلف همراه است. تحقیقات نشان می‌دهند که اختلال عملکرد میتوکندری و اختلال در اتوفاژی نقش مهمی در کاهش عملکرد بطن چپ قلب مرتبط با افزایش سن دارد (۱,۳,۵). از این‌رو، اختلال در تنظیم PINK1 و PARKIN در آسیب‌شناسی‌های مختلف قلبی دخیل است و آنها را به اهداف مهمی برای درک اثرات مداخلات ورزشی قدرتمند برای بیماری‌های قلبی تبدیل کرده‌اند. در اینکه چگونه فعالیت‌ها و تمرین‌های ورزشی می‌تواند این پروتئین‌ها را دستخوش تغییر قرار دهد برای توسعه مداخلات موثر بسیار مهم است (۶). امروزه تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT High-Intensity Interval Training) به عنوان یک روش فعالیت ورزشی پیشنهاد شده است که با دوره‌های کوتاه با فعالیت شدید و به دنبال آن دوره‌های استراحت کامل یا ورزش با شدت کم (استراحت فعال) مشخص می‌شود (۷,۸). این سبک تمرینی به دلیل کارایی آن در بهبود آمادگی جسمانی قلبی‌عروقی،

هفته‌ای و هر هفته ۵ جلسه دویدن بر روی تردمیل را اجرا کردند. در ابتدا رت‌ها به مدت یک هفته جهت کاهش و از بین بردن استرس با تردمیل مخصوص جوندگان آشنا شدند که سرعت تردمیل ۵ متر بر دقیقه با شیب صفر درجه و مدت زمان ۵ دقیقه بود. رت‌ها در شروع و پایان هر جلسه تمرین اصلی با همین سرعت آشناسازی، به گرم کردن و سرد کردن پرداختند. قبل از شروع برنامه HIIT، آزمون اندازه‌گیری حداکثر سرعت بر روی گروه پایلوت (۵ سر) که حدوداً یک هفته جلوتر از گروه تمرین اصلی بودند، جهت تنظیم و کنترل سرعت رت‌های گروه تمرین اصلی انجام گرفت. رت‌های گروه پایلوت جزء نمونه آماری ۱۲ سر نبودند و به صورت جداگانه مدنظر قرار گرفتند. این رت‌های گروه پایلوت با سرعت ۵ متر بر دقیقه شروع به دویدن کردند و هر ۳ دقیقه سرعت تردمیل ۵ متر بر دقیقه افزایش یافت تا رت‌ها به خستگی برسند (۳۳ متر بر دقیقه). معیار خستگی رت‌ها چسبیدن به انتهای تردمیل بود. سرعتی که در آن رت‌ها به خستگی رسیدند، به عنوان حداکثر سرعت در نظر گرفته شد (۱۳).

برنامه تمرین تناوبی پرشدت (HIIT): برنامه تمرین اصلی HIIT با وله‌های پرشدت ۸۵ تا ۹۵ درصد حداکثر سرعت (متر بر دقیقه) و دوره‌های استراحت فعال با شدت ۴۰ تا ۵۵ درصد حداکثر سرعت (متر بر دقیقه) برای هر جلسه در هفته بود. جزئیات برنامه تمرین تناوبی پرشدت در جدول ۱ گزارش شده است. این برنامه بر اساس برنامه تمرینی استفاده شده در مقاله علیزاده و همکاران در سال ۲۰۲۳ و سوری و همکاران در سال ۲۰۱۹ طراحی شده است (۱۴، ۱۵).

مولکولی ورزش برای توسعه مداخلات مؤثر بسیار مهم است. لذا هدف این مطالعه با تمرکز بر تعامل بین HIIT و مکانیسم‌های کنترل کیفیت میتوکندری، کمک به دانش ارزشمند فیزیولوژی ورزش و پیری‌شناسی است. بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر تمرین تناوبی پرشدت (HIIT) بر پروتئین‌های PINK1 و PARKIN در بطن چپ رت‌های پیر می‌باشد.

## روش بررسی

پژوهش حاضر از نوع تجربی - بنیادی می‌باشد. در این پژوهش، ۱۲ سر رت نر ۲۰ ماهه از نژاد ویستار با میانگین وزنی  $۴۰۰ \pm ۳۰$  گرم خریداری شدند. معیار ورود رت‌ها سن ۲۰ ماهه و بالاتر، جنسیت نر و نداشتن آسیب بدنی جهت توانایی انجام تمرین بود. رت‌ها در آزمایشگاه مخصوص حیوانات آزمایشگاهی با دمای  $۲۲ \pm ۲$  درجه سانتی‌گراد، رطوبت  $۴۰-۵۰$  درصد و چرخه تاریکی-روشنایی ۱۲-۱۲ نگهداری شدند. غذای رت‌ها به صورت آزادانه و استاندارد مخصوص حیوانات آزمایشگاهی تهیه شد. همچنین آب مورد نیاز حیوانات به صورت آزاد در بطری ۵۰۰ میلی‌لیتری ویژه حیوانات آزمایشگاهی، در اختیار آن‌ها قرار داده شد. این مطالعه دارای کد اخلاق به شماره IR.US.PSY.EDU.REC.1403.040 می‌باشد. همچنین اصول اخلاقی مطالعه مطابق با اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی مصوب مورد توجه قرار گرفت. رت‌های پیر سالم به صورت تصادفی به ۲ گروه تمرین تناوبی پرشدت (HIIT) و گروه کنترل (۶ سر در هر گروه) تقسیم شدند. گروه کنترل در طول انجام تحقیق هیچ گونه فعالیتی نداشت.

برنامه‌های تمرینی: رت‌ها در گروه تمرین یک برنامه ۸

جدول ۱: برنامه HIIT

حدود حداکثر سرعت (متر بر دقیقه)	بدنه اصلی تمرین تنایوبی پرشدت				وهله‌های پرشدت				جلسه در هفته
	شدت	مدت زمان (دقیقه)	تکرار	شدت	مدت زمان (دقیقه)	تکرار	شدت	مدت زمان (دقیقه)	
۱۲	۴	۱	۲	۵	۳	۲	۷	۳	اول
۱۵	۳	۱	۳	۶	۴	۲	۸	۴	دوم
۱۸	۲	۱	۴	۵	۵	۲	۹	۵	سوم
۲۱	۱	۱	۵	۴	۶	۲	۱۰	۵	چهارم
۲۴	۱	۱	۶	۳	۷	۲	۱۱	۵	پنجم
۲۷	۱	۱	۷	۲	۸	۲	۱۲	۵	ششم
۳۰	۱	۱	۸	۱	۹	۲	۱۳	۵	هفتم
۳۳	۱	۱	۹	۱	۱۰	۲	۱۴	۵	هشتم

حل گردید، سپس اسیدفسفوریک قطره قطره به آن اضافه شد. سپس آب را قطره قطره اضافه کرده تا محلول حاصل به حجم ۵۰ میلی لیتر رسید. محلول تهیه شده با کاغذ صافی دو بار صاف شده و در بطربه تیره داخل یخچال نگهداری شد.

۳. تهیه غلظت‌های مختلف BSA برای کشیدن منحنی استاندارد: از BSA به عنوان پروتئین استاندارد برای اندازه‌گیری میزان پروتئین استفاده می‌شود. غلظت‌های ۰/۲۵، ۰/۰۵، ۰/۰۱۵، ۰/۰۳، ۰/۰۶، ۰/۱۲۵ از پروتئین استاندارد با افزودن نصف حجم آب به غلظت قبلی ساخته شد.

۴. آماده‌سازی نمونه: نمونه‌های پروتئینی تهیه شده قبل از ریخته شدن در چاهک می‌باشد هم غلظت شده و با بافر نمونه مخلوط و به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه در آب ۱۰۰ درجه سانتی گراد جوشانده شود. این بافر موجب سنجین شدن، احیا و خطی شدن پروتئین‌ها می‌شود علاوه بر آن برموفنول بلو موجود در بافر طریقه حرکت پروتئین‌ها را در ژل نشان می‌دهد.

۵. ساخت الکتروforeز بر روی ژل SDS page: ژل SDS page از پلیمر آکریل آمید ساخته شده است که بیس آکریل آمید این پلیمر را به صورت عرضی به هم مرتبط کرده است. به گونه‌ای که منافذ با قطر معین و یکسان در ژل حاصل می‌شود. پلیمریزاسیون ژل با افزودن آمونیوم پرسولفات (APS) و تترا متیل اتیلن دی آمین (TEMED) موجب تشکیل

روش بافت‌برداری: برای از بین بدن آثار حاد تمرین و متغیرهای غیرقابل کنترل استرس آزمودنی‌ها در زمان اجرای برنامه تمرینی، بعد از ۴۸ ساعت پس از آخرین جلسه تمرین، رت‌ها با رعایت اصول اخلاقی و با تزریق درون صفاقی ترکیبی از کتامین (۳۰ تا ۵۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن) و زایلazin (۳ تا ۵ میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن)، بی‌هوش شدن. سپس بافت بطن چپ قلب بدن حیوان برداشته و بعد از شستشو در سرم فیزیولوژیک، بلا فاصله در تانک ازت منجمد شد. سپس نمونه‌های بافتی برای سنجش‌های بعدی با دمای ۸۰ در فریزر گذاشته شد.

روش آزمایشگاهی وسترن‌بلاط: از روش وسترن‌بلاط برای سنجش میزان PINK1 و PARKIN در بافت بطن چپ قلب استفاده شد که شامل مراحل زیر بود:

۱. لیز کردن بافت: برای لیز کردن بافت‌ها از Lysis buffer با ترکیب زیر استفاده شد و سپس نمونه‌ها در سانتریفیوژ مدل Eppendorph 5415 R در دمای چهار درجه سانتی گراد و با سرعت ۱۲۰۰۰ دور در دقیقه به مدت ۱۰ دقیقه سانتریفیوژ شدند. مایع شفاف (Supernatant) حاوی پروتئین استخراج و در فریزر منفی ۲۰ نگهداری شد.

۲. تعیین غلظت پروتئین به‌وسیله بردهورد: برای ساخت محلول بردهورد کوماسی بلو کاملاً در الکل به مدت ۲۰ دقیقه

کاغذ PVDF روی ژل، حباب‌هایی ایجاد شده توسط حرکت آهسته اسپیسر روی کاغذ صافی خارج گردید. در نهایت دستگاه و با ولتاژ ۱۲۰ میلی ولت به مدت یک و نیم ساعت به منبع مولد جریان متصل گشته و پروتئین‌های موجود در ژل به کاغذ منتقل گردید.

۹. مرحله بلاکینگ: در مرحله بلاکینک، محلول بلاکینک به منظور پوشاندن کاغذ برای جلوگیری از واکنش غیراختصاصی آنتی‌بادی اولیه به کار می‌رود.

۱۰. مرحله انکوبه کردن با آنتی‌بادی اولیه و ثانویه: پس از پایان یافتن زمان بلاکینگ کاغذ با آنتی‌بادی اولیه‌ای که با محلول بلاکینگ به مقدار معین آنتی‌بادی اولیه بتا-اکتین ((anti- $\beta$ -Actin) (C4) (sc-47778) (anti- $\beta$ -Actin (C4) (sc-47778) مخلوط و رقیق شده، به مدت ۱۶ تا ۱۸ ساعت انکوبه گردید. سپس کاغذ با آنتی‌بادی ثانویه با غلظت (۱:۱۰۰۰) برای تمام آنتی‌بادی‌های اولیه به مدت یک ساعت و ۱۵ دقیقه در دمای اتاق شیک شد.

۱۱. مرحله آشکارسازی: پس از شستشوی نهایی مرحله قبل آب اضافی کاغذ PVDF روی سلفون قرار گرفت و محلول کمولومینسانس با سمپلر روی نواحی باند مورد نظر ریخته شد. کاغذ در سلفون گذاشته شد و درون کاست فیلم ریخته شد. برای مشاهده باند پروتئینی مورد نظر فیلم عکاسی را بر کاغذ دارای پوشش نایلونی گذاشته و در کاست بسته شد. مدت زمان باقی ماندن فیلم در کاست به نوع آنتی‌بادی و شدت نور دیده شده از باند پروتئینی بستگی داشت. در مورد آنتی‌بادی‌های anti-PINK1 (C-3) (sc-518052) anti-PARKIN و Santa-Cruz و Santa-Cruz (D-1) (sc-133167) ساخت شرکت ۵۱۸۰۵۲ تا ۶۰ تا ۸۰ ثانیه و در مورد آنتی‌بادی بتا-اکتین ۱۰، ثانیه زمان مناسبی بود. سپس در تشک آب فیلم را به مدت ۲۰ ثانیه شسته و بعد از آن به مدت ۲۰ ثانیه در محلول ثبوت تکان داده شد. سپس مجدداً فیلم را با آب جاری شسته و با گیره آویزان کرده تا خشک شدند.

### تجزیه و تحلیل آماری

نرمال بودن داده‌ها از طریق آزمون آماری شاپیرو-ویلک

رادیکال‌های آزاد از APS شده که این رادیکال‌ها باعث پلیمریزاسون می‌شود.


۶. روش انجام آزمایش و ساختن ژل پایین و بالا: برای دورگیری ژل، ۱۰۰۰ میکرولیتر از ژل پایین کاملاً فاقد TEMED را برداشت و به آن ۴ میکرولیتر TEMED اضافه شد. سپس محلول حاصل را به سرعت از گوشه‌هایی از فضایی دو ژل ریخته شد، بعد از دورگیری ۱۵ دقیقه، فرصت داده شد تا کاملاً بگیرد و سپس محلول ژل کامل به همراه تمد را برداشته بهوسیله سمپلر در فضایی بین دو شیشه ریخته به‌طوری که تا دوسوم شیشه‌ها پر شد. سپس مقداری اتانول اشبع شده اسپری کرده تا مانع خشک شدن ژل شود و به علت سنگینی حاصل از آن سطح ژل صاف شد. حدود ۴۵ دقیقه برای پلیمریزاسیون ژل پایین لازم است و در این مرحله ژل بالا ۵ درصد آماده شد.

۷. الکتروفوز بر ژل SDS page: شیشه‌های حاوی ژل، درون تانک الکتروفوز قرار داده شدند. بافر الکتروفور اضافه گردید و سپس ابتدا مارکر پروتئین رنگی (دارای پروتئین‌های با وزن مولکولی مشخص است که رنگی می‌باشد و از ژل به کاغذ منتقل می‌شود) به میزان دو میکرولیتر در چاهک اول و نمونه‌ها در سایر چاهک‌ها به میزان ۱۲ میکرولیتر توسط سرنگ همیلتون لود شد. سپس الکتروودها را به دستگاه مولد جریان وصل کرده و تا رسیدن پروتئین‌ها به ژل پایین، حدود ۴۵ دقیقه جریان با ولتاژ ۱۲۰ برقرار شد.

۸. وسترن‌بلات یا ایمنوبلاتینگ: ایمنوبلاتینگ روشی است که طی آن باندهای پروتئینی جدا شده توسط ژل الکتروفوز به غشایی از جنس نیترو سلولوز یا PVDF انتقال یافته و سپس به وسیله آنتی‌بادی اختصاصی پروتئین‌های روی آن شناسایی می‌شود. انتقال نمونه‌ها از ژل به کاغذ توسط جریان الکتریکی صورت گرفت. بعد از اتمام الکتروفوز ژل به آرامی از شیشه‌ها جداسده و در بافر انتقال قرار گرفت. سپس کاغذ PVDF به اندازه ژل بریده شده و برای فعل شدن به مدت ۱ دقیقه در متابول شیک شده و با آب قطره شسته شد و درون بافر انتقال قرار گرفت. در حین قرار دادن کاغذ صافی روی کاغذ PVDF و

اثر از طریق آزمون Choen'd بررسی شد. شکل ۱ از طریق نرمافزار ایندیزاین نسخه ۲۰۲۳ و شکل ۲ از طریق نرمافزار گراف‌پد پریسم طراحی شد. سطح معناداری  $P \leq 0.05$  در نظر گرفته شد.

بررسی شد. با توجه به نرمال بودن داده‌ها، داده‌های متغیرهای تحقیق حاضر از طریق آزمون‌های آماری t-مستقل تجزیه و تحلیل شدند. بررسی داده‌ها، با استفاده از نرمافزارهای version 16 SPSS و گراف‌پد پریسم نسخه ۱۰/۲/۳ انجام گرفت. اندازه




شکل ۱: نمای شماتیک مراحل انجام کار

است ( $P < 0.004$ ) (شکل ۲، C و B). آزمون کohen برای اندازه‌گیری اندازه اثر میزان پروتئین PARKIN، اثر قدرتمندی را نشان داد ( $t = 2/13$ ) (Effect Sizes=۲/۱۳)؛ و نشان‌دهنده تفاوت معنی‌دار قابل توجه بین گروه HIIT نسبت به گروه کنترل است و می‌توان نتیجه گرفت که انجام HIIT می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر محتوای پروتئین PARKIN داشته باشد (شکل ۲، C و B). از طرفی دیگر مقدار t برای محتوای پروتئین بتا-اکتین ( $\beta$ -Actin) به عنوان کنترل داخل سلولی،  $0.93 \pm 0.01$  است؛ بنابراین بر اساس نتایج به دست آمده تفاوت معنی‌داری بین گروه‌های پژوهش وجود ندارد ( $P < 0.37$ ) (شکل ۲، D و B). این نشان می‌دهد انجام هشت هفته HIIT بر میزان پروتئین بتا-اکتین در بطن چپ رت‌های آزمایشگاهی تاثیر معنی‌داری ندارد (شکل ۲، D و B). آزمون کohen برای اندازه‌گیری اندازه اثر میزان پروتئین بتا-اکتین، اثر ضعیفی را نشان داد ( $t = 0.53$ ) (Effect Sizes=۰/۰۵۳).

## نتایج

تجزیه و تحلیل داده‌ها بر اساس آزمون t-مستقل نشان داد، برای محتوای پروتئین PINK1 مقدار t برابر با  $3/0.4$  است. این امر نشان می‌دهد HIIT بر میزان پروتئین PINK1 در بطن چپ رت‌ها تاثیر معنی‌داری دارد و این تاثیر به صورت افزایش در محتوای گروه HIIT نسبت به کنترل است ( $P < 0.02$ ) (شکل ۲، A و B). آزمون کohen برای اندازه‌گیری اندازه اثر میزان پروتئین PINK1، اثر قدرتمندی را نشان داد ( $t = 1/75$ ) (Effect Sizes=۱/۷۵)؛ و نشان‌دهنده تفاوت معنی‌داری قابل توجه بین گروه HIIT نسبت به گروه کنترل است و می‌توان نتیجه گرفت که انجام HIIT می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر محتوای پروتئین PINK1 داشته باشد (شکل ۲، A و B). همچنین برای محتوای پروتئین PARKIN، مقدار t برابر با  $3/70$  است. این امر نشان می‌دهد HIIT بر میزان پروتئین PARKIN در بطن چپ رت‌ها تاثیر معنی‌داری دارد و این تاثیر به صورت افزایش در محتوای گروه HIIT نسبت به کنترل



شکل ۲: مقایسه محتوای پروتئین ها در گروههای تمرين HIIT و کنترل در بطن چپ قلب.

(A). نمودار ستونی نشان دهنده مقادیر کمی شده باندهای پروتئین PINK1 در مقابل لودینگ کنترل.

(B). تصاویر وسترن بلاط محتوای پروتئین ها و  $\beta$ -Actin به عنوان لودینگ کنترل در بطن چپ قلب.

(C). نمودار ستونی نشان دهنده مقادیر کمی شده باندهای پروتئین PARKIN در مقابل لودینگ کنترل.

(D). نمودار ستونی نشان دهنده مقادیر کمی شده باندهای پروتئین  $\beta$ -Actin در مقابل لودینگ کنترل.

(\*) وجود افزایش معنی دار بین گروه HIIT نسبت به گروه کنترل در سطح  $P=0.05$

پیامدهای این یافتهها را برای درک سلامتی و بیماری قلبی برجسته می کند. به تازگی مشخص شده است که تمرينات ورزشی می توانند به طور قابل توجهی بر سطوح بیان PINK1 و PARKIN در بطن چپ رت ها تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، در تحقیقی Li و همکاران در سال ۲۰۲۱ به بررسی تأثیر تمرين های هوایی، مقاومتی و ارتعاشی (لرزشی) بر محتوای پروتئین های PINK1 و PARKIN پرداختند. محتوای پروتئین های PINK1 و PARKIN در مقایسه با گروههای کنترل افزایش قابل توجهی یافته بود. این محققان بر اساس نتایج خود بیان کردند تمرين های ورزشی میتوفاژی میوکارد را تقویت می کند و عملکرد قلب را از طریق مسیر انفارکتوس بهبود می بخشد (۱۹). نتایج تحقیق حاضر هم راستا با نتایج تحقیق Li و همکاران می باشد، زیرا در هر دو تحقیق ما شاهد افزایش معنی داری محتوای پروتئین های PINK1 و PARKIN هستیم. نوع تمرين های هوایی در تحقیق حاضر از نوع HIIT بود که رت ها یک شدت بالا را تحمل می کردند و

## بحث

این تحقیق با هدف تاثیر هشت هفته HIIT بر محتوای پروتئین های PINK1 و PARKIN در بطن چپ رت های پیر انجام شد. نتایج نشان داد که هشت هفته HIIT سبب افزایش معنی دار پروتئین های PINK1 ( $P=0.02$ ) و PARKIN ( $P=0.004$ ) نسبت به گروه کنترل در بطن چپ رت های پیر می شود. PINK1 و PARKIN اجزای حیاتی سیستم کنترل کیفیت میتوکندری هستند (۱۶، ۱۷). اختلال در تنظیم این پروتئین ها با بیماری های قلبی عروقی مختلف، از جمله نارسایی قلبی و آسیب ایسکمیک همراه است (۱۸). برنامه های HIIT در سال های اخیر به دلیل کارایی و اثربخشی آن در بهبود سلامت قلب و عروق و عملکرد متابولیک مورد توجه قرار گرفته است. همانطور که تحقیقات برای کشف مکانیسم های مولکولی زیربنایی این مزايا ادامه دارد، نقش پروتئین های خاص در عملکرد قلب به عنوان یک حوزه مهم بررسی ظاهر شده است. این بحث بر روی اثرات HIIT بر پروتئین های PINK1 و PARKIN در بطن چپ رت های آزمایشگاهی تم رکز دارد و

پارکین- میتوفاژی در محافظت و تنظیم ورزش در نارسایی قلبی نقش دارد. نتایج تحقیق Guo و همکاران در تمرينهای مقاومتی و همچنین ترکیب تمرين مقاومتی با تمرين هوایی با شدت متوسط هم راست است، زیرا در هر دو مطالعه ما شاهد افزایش محتوا و بیان پروتئینهای PINK1 و PARKIN بودیم. با این حال با افزایش شدت در تمرين Guo و همکاران بودیم. برای این نتایج متفاوت می‌توان به نوع، مدت زمان، انواع شدت و ترکیب تمرينهای ورزشی اشاره کرد. از عوامل مهم می‌توان به شرایط آزمودنی‌ها که در تحقیق حاضر رت‌های پیر و در تحقیق Guo و همکاران رت‌های جوان بودند اشاره کرد (۲۳). در تحقیقی Chen و همکاران در سال ۲۰۱۸ به بررسی نقش تخریب میتوکندری با واسطه PARKIN به دنبال انجام تمرين ورزشی در دوران پیری پرداختند. نتایج مطالعه Chen و همکاران نشان داد که جریان میتوفاژی پایه کاهش نمی‌یابد، بلکه با افزایش سن، حداقل تا سطح لیزوزوم، افزایش می‌یابد که مرتبط با جریان حاد میتوفاژی ناشی از ورزش می‌باشد و این می‌تواند وابسته به تنظیم پروتئین PARKIN باشد. این محققان بیان کردند که مطالعات بیشتری مورد نیاز است برای تعیین اینکه آیا ارتباط مستقیمی بین جریان میتوفاژی و فعالیت لیزوزومی با افزایش سن وجود دارد یا نه و یا اینکه آیا ورزش مزمن می‌تواند جریان میتوفاژی همراه با تغییرات ظرفیت لیزوزومی را بهبود بخشد یا نه (۲۴). مکانیسم‌هایی که از طریق HIIT سطوح PINK1 و PARKIN را تحت تأثیر قرار می‌دهد چند وجهی است. یکی از مکانیسم‌های پیشنهادی نقش گونه‌های اکسیژن فعال (ROS) است. نشان داده شده است که HIIT باعث افزایش گذرا در ROS می‌شود، که ممکن است به عنوان مولکول‌های سیگنالی برای فعال کردن مسیر PINK1/PARKIN عمل کند (۲۵). این استرس اکسیداتیو، به‌طور بالقوه آسیب رسان است و می‌تواند پاسخ‌های سازگاری را نیز تحریک کند که بیوژن میتوکندری و میتوفاژی را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، سازگاری‌های فیزیولوژیکی ناشی از HIIT، مانند افزایش بروون‌ده قلبی و بهبود اکسیژن‌رسانی به بافت‌ها،

این در صورتی است که در تحقیق Li و همکاران نوع تمرين هوایی با شدت متوسط بود؛ با این حال هر دو نوع تمرين بر روی ترمیل انجام شده بود. همچنین در هر دو تحقیق محتوا پروتئین‌ها در قلب از طریق روش آزمایشگاهی وسترن‌بلات اندازه‌گیری شده بود. با این وجود انجام تمرين‌های ورزشی بهویژه HIIT ممکن است عملکرد میتوکندری را بهبود بخشد و با افزایش محتوا پروتئین‌های PARKIN و PINK1 باعث حذف میتوکندری آسیب دیده شود، در نتیجه سلامت کلی قلب را ارتقا می‌دهد. افزایش سطح PINK1 به دنبال HIIT ممکن است تشخیص میتوکندری‌های ناکارآمد را تسهیل و امکان میتوفاژی کارآمدتر را فراهم کند. به طور همزمان، تنظیم مثبت PARKIN فرآیند یوبیکوئیتابسیون را افزایش می‌دهد و کنترل کیفیت میتوکندری را بیشتر پشتیبانی می‌کند. این عمل دوگانه برای حفظ یکپارچگی و عملکرد میتوکندری، به ویژه در شرایط افزایش تقاضای متابولیک، مانند موارد ناشی از HIIT، بسیار مهم است (۲۱،۲۰). گزارش شده است تمرين ورزشی شنا یا ورزش روی ترمیل برای ۳ تا ۸ هفته عملکرد تنفسی میتوکندری قلب را بهبود می‌بخشد که با کاهش تولید گونه‌های اکسیژن فعال (ROS) آشکار می‌شود. شایان ذکر است کیفیت میتوکندری قلب با بهبود بیوژن، پویایی و میتوفاژی میتوکندری آشکار می‌شود. در نهایت به نظر می‌رسد فعالیت ورزشی منجر به ویژگی‌های فیزیولوژیکی میتوکندری بهتر در قلب می‌شود (۲۲). در این راستا در تحقیقی Guo و همکاران در سال ۲۰۲۳ به بررسی ۸ هفته تمرين مقاومتی، تمرين مداوم با شدت متوسط همراه با تمرين مقاومتی و تمرين تناوبی با شدت بالا همراه با تمرين مقاومتی بر محتوا و بیان پروتئین‌های PINK1 و PARKIN پرداختند. بیان پروتئین‌ها در تمرين‌های مقاومتی و تمرين مداوم با شدت متوسط همراه با تمرين مقاومتی افزایش یافته بود. اما تمرين تناوبی با شدت بالا همراه با تمرين مقاومتی تغییر معنی‌داری را نشان نداد. این محققان بر اساس نتایج خود بیان کردند روش‌های مختلف ورزشی اثرات متفاوت قلبی‌عروقی را بر نارسایی قلبی ایجاد. همچنین مسیر HIF1α-

توجه به عملکرد پروتئین‌های PINK1 و PARKIN که از عوامل مهم و درگیر در مسیر میتوفاژی هستند، افزایش محتوای این پروتئین‌ها می‌تواند منجر به افزایش مسیر میتوفاژی در رتهای پیر شود؛ بنابراین می‌توان ذکر کرد که افزایش محتوای این پروتئین‌ها از طریق انجام HIIT سبب پاکسازی میتوکندری‌های ناقص در بطن چپ قلب رتهای پیر می‌شود و این می‌تواند برای عملکرد بهتر قلب در دوران پیری حائز اهمیت باشد. در نتیجه درک ارتباط متقابل بین ورزش، پویایی میتوکندری و عملکرد قلب در توسعه استراتژی‌های موثر برای پیشگیری و مدیریت بیماری‌های قلبی‌عروقی بسیار مهم خواهد بود؛ بنابراین برای درک کامل تاثیر فعالیت‌ها و تمرین‌های ورزشی بر عملکرد و کیفیت میتوکندری در قلب باید مطالعات بیشتری انجام شود.

### سپاس‌گزاری

این مطالعه حاصل رساله دکترای این گروه تحقیقاتی می‌باشد که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول به انجام رسیده است؛ از کلیه عزیزانی که ما را در این مطالعه یاری نمودند از جمله واحد دانشگاه آزاد واحد علی‌آباد کتول و بخش آموزش و پژوهش دانشگاه فرهنگیان تقدير و سپاس‌گزاری می‌نماییم.

**حامي مالي:** ندارد

**تعارض در منافع:** وجود ندارد.

### ملاحظات اخلاقی

بروپوزال این تحقیق توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول تایید شده است و دارای کد اخلاق IR.IAU.B.REC.1401.030: می‌باشد.

### مشارکت نویسندها

آقای مهدی مارزلو در ارائه ایده، خانم دکتر ندا آقایی بهمن بگلو در طراحی مطالعه، آقای دکتر حبیب اصغرپور در جمع‌آوری داده‌ها، آقای دکتر حامد علیزاده پهلوانی در تجزیه و تحلیل داده‌ها مشارکت داشته و همه نویسندها در تدوین، ویرایش اولیه و نهایی مقاله و پاسخگویی به سوالات مرتبط با مقاله سهیم هستند.

احتمالاً محیطی مناسب را برای سلامت میتوکندری ایجاد می‌کند. از طرف دیگر، به نظر می‌رسد افزایش جریان خون می‌تواند تامین مواد مغذی و اکسیژن لازم را برای عملکرد بهینه میتوکندری تسهیل کند و بیان PINK1 و PARKIN را به عنوان بخشی از یک پاسخ تطبیقی گسترش‌های تقویت کند. در حالیکه HIIT اثرات قابل توجهی بر سطوح PINK1 و PARKIN نشان داده است، مقایسه این یافته‌ها با سایر اشکال ورزش، مانند تمرین مداوم با شدت متوسط (MICT) ضروری است. مطالعات نشان می‌دهند که MICT نیز به طور مثبت بر پویایی میتوکندری از طریق مکانیسم‌های مختلف و به میزان‌های متفاوت تأثیر می‌گذارد. به عنوان مثال، MICT با افزایش بیوژن میتوکندری از طریق فعال شدن PGC-1α، بدون اینکه لزوماً همان سطوح استرس اکسیداتیو HIIT را القا کند، مرتبط است (۲۶، ۲۷). از این‌رو، به‌نظر می‌رسد شدت و مدت ورزش نقش مهمی در تعیین میزان PINK1 و PARKIN HIIT دارد. که با فعالیت‌های انفجاری کوتاه مدت شدید مشخص می‌شود، ممکن است استرس میتوکندری قابل توجهی را القاء کند، در نتیجه مسیر PINK1/PARKIN را قوی‌تر از MICT فعال می‌کند (۲۸). پیامدهای افزایش سطح PINK1 و PARKIN در زمینه HIIT بسیار پیچیده است. بهبود کنترل کیفیت میتوکندری ممکن است منجر به بهبود عملکرد قلب و انعطاف‌پذیری در برابر عوامل است که در آن اختلال عملکرد میتوکندری یک ویژگی مشترک است (۲۹). علاوه بر این، توانایی HIIT برای بالا بردن این پروتئین‌های بالقوه درمانی برای افراد در معرض خطر یا مبتلا به بیماری قلبی پیشنهاد می‌شود. لذا گنجاندن HIIT در برنامه‌های توانبخشی می‌تواند سلامت میتوکندری را ارتقا دهد و در نتیجه بهبودی و عملکرد کلی قلب را افزایش دهد.

### نتیجه‌گیری

HIIT به‌طور قابل توجهی محتوای پروتئین‌های PINK1 و PARKIN را در بطن چپ رتهای افزایش داد و بر اهمیت کنترل کیفیت میتوکندری در سلامت قلب تاکید می‌کند. با

## References:

- 1-Alizadeh Pahlavani H, Laher I, Knechtle B, Zouhal H. *Exercise and Mitochondrial Mechanisms in Patients with Sarcopenia*. Front Physiol 2022; 13: 1040381.
- 2-Shih H, Lee B, Lee RJ, Boyle AJ. *The Aging Heart and Post-Infarction Left Ventricular Remodeling*. J Am College Cardiol 2011; 57(1): 9-17.
- 3-Alizadeh-Pahlavani H, Rajabi H, Nabiuni M, Motamed P, Khaledi N. *The Effect of Aerobic Exercise and Melatonin Consumption on the Expression of Bax and BCL-2 Markers in Rat Myocard after Ischemia-Reperfusion*. Journal of Isfahan Medical School 2017; 35(423): 318-25.[Persian]
- 4-Pahlavani HA. *Exercise-Induced Signaling Pathways to Counteracting Cardiac Apoptotic Processes*. Front Cell Dev Biol 2022; 10: 950927.
- 5-No MH, Choi Y, Cho J, Heo JW, Cho EJ, Park DH, et al. *Aging Promotes Mitochondria-Mediated Apoptosis in Rat Hearts*. Life 2020; 10(9): 178.
- 6-Alizadeh Pahavani H, Rajabi H, Nabiuni M, Motamed P, Khaledi N, Tayanloo A. *The Effect of Aerobic Exercise with Medium and High Intensity on the Gene Expression of Bax (BCL2 Associated X) and Bcl-2 (B-Cell Lymphoma 2) Markers in Rat Myocard after Ischemic-Reperfusion*. Sport Physiology 2020; 12(45): 31-44.
- 7-Pahlavani HA, Rajabi H, Nabiuni M, Motamed P, Khaledi N. *The Effect of Anaerobic Exercise with Melatonin Consumption on the Expression of Bax and Bcl-2 Markers in Rat Myocardium after Ischemic-Reperfusion*. Med J Tabriz Uni Med Sci 2019; 41(3): 68-77.
- 8-Sherafati-Moghadam M, Pahlavani HA, Daryanoosh F, Salesi M. *The Effect of High-Intensity Interval Training (HIIT) on Protein Expression in Flexor Hallucis Longus (FHL) and Soleus (SOL) in Rats with Type 2 Diabetes*. Journal of Diabetes & Metabolic Disorders 2022; 21(2): 1499-508.
- 9-Taylor JL, Barnes JN, Johnson BD. *The Utility of High Intensity Interval Training to Improve Cognitive Aging in Heart Disease Patients*. Int J Environ Res Public Health 2022; 19(24): 16926.
- 10-Grace F, Herbert P, Elliott AD, Richards J, Beaumont A, Sculthorpe NF. *High Intensity Interval Training (HIIT) Improves Resting Blood Pressure, Metabolic (MET) Capacity and Heart Rate Reserve without Compromising Cardiac Function in Sedentary Aging Men*. Exp Gerontol 2018; 109: 75-81.
- 11-Coswig VS, Barbalho M, Raiol R, Del Vecchio FB, Ramirez-Campillo R, Gentil P. *Effects of High Vs Moderate-Intensity Intermittent Training on Functionality, Resting Heart Rate and Blood Pressure of Elderly Women*. J Transl Med 2020; 18(1): 88.
- 12-Han C, Lu P, Yan SZ. *Effects of High-Intensity Interval Training on Mitochondrial Supercomplex Assembly and Biogenesis, Mitophagy, and the AMP-Activated Protein Kinase Pathway in the Soleus Muscle of Aged Female Rats*. Exp Gerontol 2022; 158: 111648.
- 13-Garcia NF, Sponton AC, Delbin MA, Parente JM, Castro MM, Zanesco A, et al. *Metabolic Parameters and Responsiveness of Isolated Iliac Artery in Ldlr-/Mice: Role of Aerobic Exercise Training*. Am J Cardiovasc Dis 2017; 7(2): 64-71.
- 14-Soori R, Gerami M, Pornemati P, Eskandari A. *Effect of High Intensity Interval Training and*

- Continus Training on Antioxidant Enzymes in the Heart of the Old Rats.* J Gorgan Univ Medical Sci 2019; 21(2): 26-31.
- 15-**Alizadeh R, Salehi O, Rezaeinezhad N, Hosseini SA. *The Effect of High Intensity Interval Training with Genistein Supplementation on Mitochondrial Function in the Heart Tissue of Elderly Rats.* Experimental Gerontology 2023;171:112039.
- 16-**Xiao B, Goh JY, Xiao L, Xian H, Lim KL, Liou YC. *Reactive Oxygen Species Trigger Parkin/PINK1 Pathway-Dependent Mitophagy by Inducing Mitochondrial Recruitment of Parkin.* J Biol Chem 2017; 292(40): 16697-708.
- 17-**McLlland GL, Soubannier V, Chen CX, McBride HM, Fon EA. *Parkin and PINK 1 Function in a Vesicular Trafficking Pathway Regulating Mitochondrial Quality Control.* EMBO J 2014; 33(4): 282-95.
- 18-**Wu Y, Jiang T, Hua J, Xiong Z, Dai K, Chen H, et al. *PINK1/Parkin-Mediated Mitophagy in Cardiovascular Disease: From Pathogenesis to Novel Therapy.* Int J Cardiol 2022; 361: 61-69.
- 19-**Li H, Qin S, Liang Q, Xi Y, Bo W, Cai M, et al. *Exercise Training Enhances Myocardial Mitophagy and Improves Cardiac Function Via Irisin/FNDC5-PINK1/Parkin Pathway in MI Mice.* Biomedicines 2021; 9(6): 701.
- 20-**Dorn II GW. *Central Parkin: The Evolving Role of Parkin in the Heart.* Biochim Biophys Acta 2016; 1857(8): 1307-12.
- 21-**Seabright AP, Lai YC. *Regulatory Roles of PINK1-Parkin and AMPK in Ubiquitin-Dependent Skeletal Muscle Mitophagy.* Front Physiol 2020; 11: 608474.
- 22-**Viloria MAD, Li Q, Lu W, Nhu NT, Liu Y, Cui Z-Y, et al. *Effect of Exercise Training on Cardiac Mitochondrial Respiration, Biogenesis, Dynamics, and Mitophagy in Ischemic Heart Disease.* Front Cardiovasc Med 2022; 9: 949744.
- 23-**Guo C, Wu RY, Dou J-H, Song SF, Sun XL, Hu YW, et al. *Mitophagy-Dependent Cardioprotection of Resistance Training on Heart Failure.* J Appl Physiol 2023; 135(6): 1390-401.
- 24-**Chen CCW, Erlich AT, Crilly MJ, Hood DA. *Parkin is Required for Exercise-Induced Mitophagy in Muscle: Impact of Aging.* Am J Physiol Endocrinol Metab 2018; 315(3): E404-E15.
- 25-**Chen CCW, Erlich AT, Hood DA. *The Role of P53 in Determining Mitochondrial Adaptations to Endurance Training in Skeletal Muscle.* Skelet Muscle 2018; 8: 10.
- 26-**Reisman E. *Analysis of Changes in Mitochondrial Proteins in Single Muscle Fibres with Different Types of Training*[dissertation]. Victoria University; 2020.
- 27-**Cui K. *Human Skeletal Muscle Transcriptomic Analysis of Pathways Associated with Autophagy and Mitophagy in Response to a Single Session of High-Intensity Interval Exercise in Hypoxia*[dissertation]. Victoria University; 2024.
- 28-**Ruegsegger GN, Pataky MW, Simha S, Robinson MM, Klaus KA, Nair KS. *High-Intensity Aerobic, but Not Resistance or Combined, Exercise Training Improves both Cardiometabolic Health and Skeletal Muscle Mitochondrial Dynamics.* J Appl Physiol (1985) 2023; 135(4): 763-74.
- 29-**Guo C, Chen MJ, Zhao JR, Wu RY, Zhang Y, Li QQ, et al. *Exercise Training Improves Cardiac Function and Regulates Myocardial Mitophagy Differently in Ischaemic and Pressure- Overload Heart Failure Mice.* Exp Physiol 2022; 107(6): 562-74.

## The effect of eight weeks of high intensity interval training (HIIT) on the content of mitochondrial fission and fusion proteins in the left ventricle of old rats

Mahdi Marezloo<sup>1</sup>, Neda Aghaei Bahmanbeglou<sup>+1</sup>, Hamed Alizadeh pahlavani<sup>2</sup>, Habib Asgharpour<sup>1</sup>

### Original Article

**Introduction:** As individual grow older, the likelihood of developing cardiovascular diseases increases significantly. Currently, high-intensity interval training (HIIT) is regarded as a strategy for exercise to improve heart disease. Consequently, the aim of this research was to investigate the impact of eight weeks of HIIT on the levels of PINK1 and PARKIN proteins in the left ventricle of aged rats.

**Methods:** The present research was of an experimental type and involved twelve male rats, each 20 months old, with an average weight of  $400 \pm 30$  grams. The rats were randomly divided into HIIT and control groups (each group had 6 rats).

The HIIT program consisted of high-intensity bouts of 85-95% of maximum speed (m/min) and active rest periods with an intensity of 40-55% of maximum speed (m/min) during each weekly session. Following a 48-hour period post the most recent training session, the rats were subjected to anaesthesia through the administration of Ketamine and Xylazine. Subsequently, the left ventricle of the heart was excised, and the various parameters were measured utilizing the western blot laboratory technique. Data were analysed using the Shapiro-Wilk test and independent t-test conducted within SPSS16. A significance threshold of  $P \geq 0.05$  was considered for this analysis.

**Results:** Eight weeks of HIIT caused a significant increase in PINK1 ( $P=0.02$ ) and PARKIN ( $P=0.004$ ) protein levels in the left ventricle of aged rats, in comparison to the control group.

**Conclusion:** It seems that HIIT may influence the quality of mitochondria within the left ventricle of the hearts of aged rats, indicating potential implications for health-related applications.

**Keywords:** High-intensity interval training, Left ventricle, PARKIN protein, PINK1 protein.

**Citation:** Marezloo M, Aghaei Bahmanbeglou N, Alizadeh Pahlavani H, Asgharpour H. The effect of eight weeks of high intensity interval training (HIIT) on the content of mitochondrial fission and fusion proteins in the left ventricle of old rats. J Shahid Sadoughi Uni Med Sci 2024; 32(10): 8318-29.

<sup>1</sup>Department of Physical Education and Sports Sciences, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran.

<sup>2</sup>Department of Physical Education, Farhangian University, P.O. Box 14665-889, Tehran, Iran.

\*Corresponding author: Tel: 09191992996, email: nedaaghiae@aliabadiau.ac.ir