

بررسی سطح سرمی IgG ضد توکسوبلاسمای گوندی در افراد مبتلا و غیر مبتلا به میگرن

نیلوفر جویانی^۱، محمد تقی احمدی^{۲*}، وحید عباسی^۳

مقاله پژوهشی

مقدمه: بیش از ۵۰۰ میلیون نفر در سراسر دنیا آلوده به توکسوبلاسمای گوندی هستند. ازوی دیگر، میگرن به عنوان عномی ترین سندروم درد شناخته شده است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی سطح سرمی IgG ضد توکسوبلاسمای گوندی در افراد مبتلا و غیر مبتلا به میگرن و ارتباط احتمالی بین توکسوبلاسموز مزمون و میگرن بود.

روش بررسی: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی، پنجاه نفر (۷۰-۶۰ زن در محدوده سنی ۴۳-۴۰ مرد و ۷۰-۶۰ سال) مبتلا به میگرن (گروه بیمار) براساس معیارهای بالینی و تشخیصی پزشک متخصص مغز و اعصاب و ۵۰ نفر (۷۰-۶۰ مرد و ۴۳-۴۰ زن در محدوده سنی ۲۰-۲۰ سال) غیر مبتلا به میگرن (گروه شاهد) انتخاب شدند. سطح سرمی ایمونوگلوبولین IgG ضد توکسوبلاسمای گوندی با استفاده از روش الایزا اندازه گیری شد. در این آزمون، عیار حداقل میزان IgG ضد توکسوبلاسمای گوندی برابر ۱۰ IU/ml در نظر گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار SPSS; Version 18 و آزمون های کای اسکویر و t-test استفاده شد.

نتایج: ۳۸ درصد مبتلایان به میگرن و ۳۲ درصد گروه شاهد دارای IgG ضد توکسوبلاسمای گوندی بالای ۱۰ IU/ml بودند. میانگین مقادیر IgG در گروه بیمار (میگرن مثبت) ۱۷۳/۴۲ و در گروه شاهد (میگرن منفی) ۶۸/۲۵ IU/ml بود. این نتایج نشان می دهد که در افراد مبتلا به میگرن، سطح سرمی IgG ضد توکسوبلاسمای گوندی ۲/۵ برابر بیشتر از افراد غیر مبتلا به میگرن می باشد ($p<0.05$).

نتیجه گیری: براساس یافته های این مطالعه نتیجه گیری می شود که سطح سرمی IgG ضد توکسوبلاسمای گوندی در افراد مبتلا به میگرن به طور معنی داری بیشتر از افراد سالم و غیر مبتلا به میگرن می باشد. لذا پیشنهاد می شود که مبتلایان به میگرن، از نظر عفونت توکسوبلاسموز مزمون مورد بررسی قرار گیرند.

واژه های کلیدی: آنتی بادی IgG، توکسوبلاسمای گوندی، توکسوبلاسموز مزمون، میگرن، الایزا

ارجاع: جویانی نیلوفر، احمدی محمد تقی، عباسی وحید. بررسی سطح سرمی IgG ضد توکسوبلاسمای گوندی در افراد مبتلا و غیر مبتلا به میگرن . مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی بزد ۱۳۹۹؛ ۲۸(۱): ۲۳۱۵-۲۳۱۵.

۱- کارشناسی ارشد میکروب شناسی، گروه زیست شناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

۲- استادیار، گروه زیست شناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

۳- استادیار، گروه نورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

(نویسنده مسئول): تلفن: ۹۱۴۴۵۱۵۴۸۶، پست الکترونیکی: mtadvm@yahoo.com، صندوق پستی: ۵۶۱۵۷۳۱۵۶۷

مقدمه

اختلالات خلقی و استرس با میگرن ارتباط دارد (۸). توکسپلاسمای گوندی یک انگل تک یاخته درون سلولی اجباری مربوط به شاخه ای کمپلکسا، رده اسپیوروزوا و خانواده سارکوسیستیده است (۹). مخزن و میزبان طبیعی این انگل گریه‌ها و میزبان واسط آن طیف وسیعی از مهره‌داران خون‌گرم از جمله انسان می‌باشد. در انسان آلودگی به این تک یاخته می‌تواند منجر به عفونت توکسپلاسموزیس حاد، مزمن و مادرزادی شود. توکسپلاسمای گوندی دارای سه مرحله مورفولوژیکی اووسیست، تاکیزوایت و کیست نسجی (برادیزوایتها) است که هر سه برای انسان عفونت‌زا هستند (۱۰). در افراد دچار نقص ایمنی اکتسابی، عفونت توکسپلاسموزیس می‌تواند منجر به آنسفالیت و مرگ شود. همچنین در خانم‌های باردار ابتلا به این بیماری انگلی مخصوصاً در سه ماهه اول آبستنی با خطر سقط جنین همراه می‌باشد (۱۱). آلودگی به توکسپلاسمای گوندی با بلع اووسیست‌های رسیده به واسطه غذا و آب و یا در اثر مصرف گوشت نپخته یا نیمپز آلوده به کیست‌های نسجی انگل اتفاق می‌افتد (۱۲). آلودگی به توکسپلاسمای گوندی در کشورهای مختلف و جمعیت‌های انسانی جهان به‌طور گسترده‌ای گزارش می‌شود. تقریباً نزدیک به دو میلیارد نفر در سراسر دنیا دچار عفونت مزمن توکسپلاسموزیس می‌باشند (۱۳).

در ایران، گروهی از پژوهش‌گران در مطالعه خود در گرگان، عفونت توکسپلاسمای گوندی در بین خانم‌های باردار و فراوانی آنتی‌بادی IgG ضد توکسپلاسمای گوندی را $39/8\%$ برآورد کردند (۱۴). در یک مطالعه سروپیدمیولوژیکی، احدي و همکاران (۲۰۱۰)، میزان شیوع توکسپلاسموزیس مزمن (IgG) را در خانم‌های باردار اردبیل 47 درصد به‌دست آوردند (۱۵). مطابق نظر پراندوتا (۲۰۰۷)، توکسپلاسمای گوندی ممکن است مسئول التهاب نوروزنیک به‌عنوان علت اصلی انواع سردردها از جمله میگرن و تنش عصبی بوده باشد. او همچنین پیشنهاد کرد که بسیاری از اختلالات و تغییرات بیوشیمیایی و ایمونولوژیکی ناشی از التهاب و عفونت مزمن توکسپلاسمای گوندی، مسئول و مسبب علائم عصبی مانند سردرد، سرگیجه و غش در کودکان و نوجوانان با اینمی ناقص و نشانگان جسمی و روانی

میگرن به‌عنوان شایع‌ترین سردرد مزمن (۱) نوعی اختلال مزمن با پاتوفیزیولوژی پیچیده است که معمولاً همراه با التهابات عصبی-عروقی می‌باشد (۲). براساس تعریف انجمن بین‌المللی درد، میگرن به دو نوع میگرن همراه با اورا یا علائم عصبی کانونی (Migraine with aura) (MA) و میگرن بدون اورا Migraine without aura (MO) (MO) با بدون علائم عصبی کانونی (کانونی طبقه‌بندی می‌شود (۳). اورای میگرن یک عارضه عصبی کانونی می‌باشد که ممکن است پیش از میگرن و یا همزمان با حمله میگرنی بروز کند. اورا شامل علائمی به صورت اختلالات بینایی (مانند نورگریزی)، حسی (از قبیل صداترسی) و حرکتی است که معمولاً در مدتی کمتر از یک ساعت اتفاق می‌افتد (منبع). یکی از مسایل مهم آن است که مبتلایان به میگرن بدون اورا (MO) نسبت به انواع محرک‌های درونی و بیرونی اعم از تغییرات فیزیولوژیک، هورمونی، تغییر برنامه غذایی، تغییرات آب و هوایی، زیست محیطی و اضطراب و هیجان و استرس حساس می‌باشند (۴،۳). اهمیت میگرن به‌دلیل شیوع گسترده آن در جهان و ایجاد ناتوانی‌های مختلف در مبتلایان است. بر اساس گزارش WHO میگرن جایگاه نوزدهم اختلالات ناتوان کننده انسان را دارا می‌باشد. میگرن سبب اختلال عملکرد بیمار می‌شود و منجر به آسیب‌های روانی، اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی می‌شود (۴). شیوع میگرن در بین زنان (۱۵ درصد) بیشتر از مردان (۷ درصد) است (۵). سالانه بیش از ۲۴۰ میلیون نفر در دنیا از میگرن و حمله سردرد رنج می‌برند (۶). مطالعه انجام شده توسط رجبی و عباسی در باره شیوع سردردهای میگرنی در بین دانشجویان دختر دانشگاه خلیج فارس بوشهر نشان می‌دهد که $10/94$ درصد این دانشجویان مبتلا به سردردهای میگرنی هستند. (۷). در یک مطالعه در همدان، فراوانی میگرن در بین افراد مراجعه کننده به درمانگاه نورولوژی بیمارستان سینا $12/8\%$ تعیین شد و بیشترین تعداد بیماران میگرنی (۶۸/۷٪) زن بودند (۴). عزیزی و همکاران (۱۳۹۶) در یک مطالعه فراتحلیلی، عوامل روان شناختی بروز میگرن را در ایران مورد بررسی قرار دادند. نتایج این مطالعه نشان داد که متغیرهای روان‌شناختی از جمله عواطف و

روش بررسی

این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی بوده است. تعداد ۱۰۰ نفر وارد مطالعه شدند که شامل ۵۰ بیمار مبتلا به میگرن و ۵۰ فرد سالم می‌باشند. افراد مورد مطالعه (گروه بیمار و گروه شاهد) به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای از بین بردن تورش از روش یکسوکور استفاده شد. به این معنی که افراد مورد مطالعه به هیچ وجه نمی‌دانستند که در چه گروهی (بیمار یا شاهد) قرار دارند. همچنین به منظور حذف تاثیر عوامل دموگرافیک مداخله‌گر، اقدام به همسان‌سازی و جور کردن افراد گروه بیمار و گروه شاهد از نظر سن و جنس، از بین مراجعه کنندگان هر دو گروه به درمانگاه گردید. از طرف دیگر برای برطرف نمودن مداخله و عوامل تورش مربوط به اجرای آزمایشات، تمامی مراحل الایزا در یک آزمایشگاه و با یک دستگاه الایزا ریدر و توسط یک کارشناس متبحر انجام شد. پنجاه نفر (۷ مرد و ۴۳ زن در محدوده سنی ۲۰-۶۰ سال) مبتلا به میگرن با توجه به تاریخچه بیماری، علائم بالینی و تست میگرن (به عنوان گروه بیمار) توسط پزشک متخصص مغز و اعصاب (کلینیک مغز و اعصاب دکتر عباسی اردبیل) انتخاب شدند. در تشخیص میگرن و انتخاب افراد مبتلا به میگرن، شدت، فرکانس و طول مدت سردرد به عنوان معیارهای اصلی شد. فرکانس سردرد در طول عمر و نمره صفر تا ۱۰ براساس سوالی که از بیمار می‌شد مشخص می‌شد (نمره ۱۰ برای شدیدترین سردرد در طول عمر و نمره صفر برای نداشتن سردرد). فرکانس سردرد با تعیین تعداد سردرد در ماه و مدت سردرد بر اساس مدت زمان هر حمله سردرد به ساعت مشخص می‌گردید. همچنین ۵۰ نفر دیگر (۷ مرد و ۴۳ زن در محدوده سنی ۲۰-۶۰ سال) که سالم و فاقد سابقه و نشانه‌های ابتلا به میگرن بودند (به عنوان گروه شاهد) در نظر گرفته شدند. گروه شاهد نیز از بین مراجعه کنندگان به کلینیک مغز و اعصاب و زیر نظر پزشک متخصص مورد انتخاب قرار گرفتند. لازم به ذکر است که گروه شاهد از بین افرادی که در تست سردرد مزمن (میگرن) کاملاً منفی بودند و عارضه مهم دیگر و سابقه درمان میگرن نداشتند انتخاب شدند. و توزیع جنسیت و سن افراد گروه شاهد مطابق با گروه بیمار همگن و جورسازی گردید. معیارهای ورود و خروج در انتخاب افراد، سابقه بیماری و درمان

در بزرگسالان می‌باشند (۱۶). یکی از مصادیق ارتباط توکسوبلاسموز با اختلالات نورولوژیک که با انجام مطالعات متعدد و با استفاده از روش‌های پژوهشی معتبر و دقیق مورد تایید قرار گرفته است شیزووفرنی است (۱۷). براساس مطالعات in vivo، انگل توکسوبلاسمما در فرآیند تهاجم به طور ترجیحی ماکروفازها و سلول‌های دودمان دندریتیک را برای ایجاد عفونت مورد هدف قرار می‌دهد. در نتیجه، کیست‌های نسجی انگل در شکل مزمن، به صورت نهفته و مخفی در سیستم اعصاب مرکزی و عضله اسکلتی لوکالیزه و ثابتیت می‌شوند (۱۸). با توجه به اینکه در عفونت مزمن و نهفته توکسوبلاسموز، انگل توکسوبلاسمما گوندی در سیستم اعصاب مرکزی (CNS) مستقر می‌شود (توکسوبلاسموز مغزی) لذا می‌تواند زمینه‌ساز یا تشدید کننده برخی از بیماری‌ها یا اختلالات مرتبط با سیستم عصبی و مغز گردد. توکسوبلاسمما گوندی در سیستم اعصاب مرکزی میزبانان واسطه به خصوص انسان به صورت کیست‌های داخل نورونی مستقر می‌شود و به این خاطر، معمولاً امکان از بین بردن آن‌ها توسط سیستم ایمنی بدن میزبان وجود ندارد. در افرادی که حتی دارای سیستم ایمنی کامل هستند آلودگی مغزی توکسوبلاسمما باعث ایجاد سردردهای شدید و مزمن می‌شود (۱۹). با توجه به شیوع گسترده میگرن در جوامع مختلف و ناتوانی‌های و عوارض مهم این اختلال در مبتلایان و از طرف دیگر، با عنایت به مشکلات و پیچیدگی‌هایی که در مسیر درمان موفقیت‌آمیز این عارضه وجود دارد، لذا بررسی ارتباط عفونت توکسوبلاسموز مزمن (توکسوبلاسموز مغزی) در مبتلایان به میگرن و میزان تاثیر این عفونت انگلی در بروز شدت میگرن می‌تواند جنبه نوآوری داشته باشد. هدف اصلی از انجام این تحقیق، بررسی و ارزیابی میزان شیوع عفونت توکسوبلاسموزیس مزمن در افراد مبتلا به میگرن و همچنین بررسی ارتباط احتمالی بین عفونت توکسوبلاسموزیس مزمن و میگرن بود. به همین منظور، بعد از انتخاب افراد مبتلا به میگرن (گروه بیمار) و افراد سالم غیرمبتلا به میگرن (گروه شاهد)، سطح سرمی آنتی‌بادی IgG ضد توکسوبلاسمما گوندی در این افراد اندازه‌گیری شد.

گرفته شد و بنابراین مقادیر بالای IU/ml ۱۱ به عنوان توکسوبلاسموز مثبت محاسبه گردید.

تجزیه و تحلیل آماری

جهت بررسی آماری داده‌ها، از نرم‌افزار SPSS Version 18 استفاده شد. برای تعیین معنی‌دار بودن میزان سطح سرمی IgG ضد توکسوبلاسمما گوندی در نمونه‌های سالم و بیمار (مبتلا به میگرن) از آزمون‌های کای اسکویر و t-test استفاده شد. سطح معنی‌داری کمتر از ۰/۰۵ جهت محاسبات آماری در نظر گرفته شد.

ملاحظات اخلاقی

پروپوزال این تحقیق، توسط کمیته اخلاق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل مورد تایید قرار گرفته است (کد اخلاقی (IR.IAO.ARDABIL.REC.1396-12).

نتایج

از بین ۵۰ نفر مبتلا به میگرن (گروه بیمار) ۱۹ نفر دارای IgG آنتی‌توکسوبلاسمما گوندی بالاتر از IU/ml ۱۱ بودند (۳۸٪). در ۲ مورد از افراد گروه بیمار مقادیر IgG بالاتر از IU/ml ۷۰۰ بود. در حالی‌که در بین ۵۰ نفر غیرمبتلا به میگرن (گروه شاهد)، ۱۶ نفر دارای IgG آنتی‌توکسوبلاسمما گوندی بالاتر از IU/ml ۱۱ بودند (۳۲٪). از طرف دیگر میانگین مقادیر IgG ضد توکسوبلاسمما گوندی در بین ۱۹ نفر مورد مثبت گروه بیمار (میگرن مثبت) IU/ml ۱۷۳/۴۲ و در بین ۱۶ مورد مثبت گروه شاهد (میگرن منفی) IU/ml ۶۸/۲۵ محاسبه گردید. بیشترین تعداد مبتلایان به توکسوبلاسموز در گروه سنی ۲۰-۴۰ (۵۲/۶۳٪) قرار داشت. همچنین میانگین مقادیر سرمی IgG ضد توکسوبلاسمما گوندی در این گروه بیشتر از سایر گروه‌های سنی بود (جدول ۱). هرچند درصد ابتلا به عفونت مزمن توکسوبلاسمما گوندی در بین مبتلایان به میگرن به مرتبه بیشتر از گروه شاهد (غیرمبتلا به میگرن) بود ولی این تفاوت از نظر آماری معنی‌دار نبود ($p > 0.05$). البته با مقایسه میانگین مقادیر سرمی IgG آنتی‌توکسوبلاسمما گوندی در گروه بیمار و میگرن مثبت (۱۷۳/۴۲) و گروه شاهد و میگرن منفی (۶۸/۲۵) نتیجه گرفته می‌شود که غلطت و مقادیر سرمی IgG در مبتلایان به میگرن بیش از ۲/۵ برابر گروه غیر مبتلا به میگرن است و این تفاوت از نظر آماری معنی‌دار می‌باشد.

آن‌ها بود. بنابراین، افرادی که سابقه درمان دارویی توکسوبلاسموز و میگرن داشتند از مطالعه خارج شدند. پس از اخذ مجوز از کمیته اخلاق دانشگاه و اخذ رضایت نامه از تمامی افراد تحت مطالعه، اطلاعات دموگرافیک و نتایج آزمایشات در پرسشنامه تحقیقاتی ثبت گردید. محل نمونه گیری و انجام آزمایشات آزمایشگاه آرین اردبیل بود. مقدار ۵ میلی‌لیتر خون از هر فرد تحت مطالعه تهیه و پس از انجام سانتریفوژ، سرم خون تا زمان انجام آزمایش سرولوژیکی در دمای منهای ۲۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری شد. به‌منظور تشخیص عفونت توکسوبلاسموزیس مزمن، پس از تهیه و آماده‌سازی کیت سنجش آنتی‌بادی IgG ضد توکسوبلاسمما گوندی (پیشتاز طب) اندازه‌گیری سطح سرمی آنتی‌بادی IgG با استفاده از روش ELISA و سنجش جذب نوری با دستگاه الایزا ریدر با فیلتر nm ۴۵۰ انجام شد (آزمایشگاه تشخیص طبی آرین اردبیل). لازم به ذکر است که حساسیت و ویژگی کیت مورد استفاده جهت اندازه‌گیری آنتی‌بادی IgG ضد توکسوبلاسمما به ترتیب ۱۰۰ درصد و ۹۹/۱۷ درصد بود. مراحل انجام الایزا به این ترتیب بود که بعد از انتخاب تعدادی چاهک، نمونه‌ها را با محلول رقیق کننده به نسبت ۱ به ۱۰۱ رقیق کردیم. سپس ۱۰۰ میکرولیتر از استانداردها در ۱۰ چاهک و ۱۰۰ میکرولیتر کنترل در ۲ چاهک و در بقیه چاهک‌ها ۱۰۰ میکرولیتر از نمونه ریخته شد. چاهک‌ها به مدت ۳۰ دقیقه میکرولیتر از نمونه ریخته شد. چاهک‌ها ۵ بار (هر بار با افزودن ۳۰۰ میکرولیتر محلول شستشو به چاهک) شستشو شدند. سپس ۱۰۰ میکرولیتر محلول آنزیم (کنزوگه) به داخل چاهک‌ها اضافه شده و انکوبه شدند. دوباره محظیات چاهک را خالی کردن محتویات، چاهک‌ها ۵ بار (چاهک‌ها افزوده شد و چاهک‌ها در تاریکی به مدت ۱۵ دقیقه انکوبه گردیدند. بعد از خالی کردن محتویات، چاهک‌ها ۱۰۰ میکرولیتر محلول کروموزن و رنگزا به دادیم. در ادامه ۱۰۰ میکرولیتر محلول شستشو قرار گردید. سرانجام به هر چاهک ۱۰۰ میکرولیتر محلول متوقف کننده اضافه گردید تا واکنش‌های آنزیمی متوقف شوند. برای سنجش جذب نوری هر چاهک از دستگاه الایزا ریدر با فیلتر nm ۴۵۰ نانومتر استفاده و جذب نوری چاهک‌ها قرائت گردید. در این مطالعه، مقدار cut-off معادل ۱۰ IU/ml و مقدار ۹-۱۱ IU/ml به عنوان محدوده مشکوک در نظر گرفته شد.

(میگرن منفی)، ۵ نفر مرد (۳۱/۲۵٪) و ۱۱ نفر زن (۶۸/۷۵٪) بودند (جدول های ۱ و ۲).

باشد ($p<0.05$). از نوزده مورد توکسوبلاسمای مثبت در گروه بیمار (میگرن مثبت)، ۳ نفر مرد (۱۵/۷۸٪) و ۱۶ نفر زن (۸۴/۲۲٪) و از شانزده مورد توکسوبلاسمای مثبت در گروه شاهد

جدول ۱: اطلاعات زمینه ای (سن و جنس) و میزان IgG سرمی توکسوبلاسمای گوندی در پنجاه بیمار میگرنی (گروه بیمار)

میانگین توکسوبلاسمای (IU/ml)	مبتلایان به توکسوبلاسمای تعداد (درصد)		مبتلایان به میگرن تعداد (درصد)		گروه سنی
	مرد	زن	مرد	زن	
-	۰	۰	(۱/۲)	(۱/۲)	کمتر از ۲۰ سال
۲۱۰ IU/ml	(۰/۱۸)۹	(۰/۲)۱	(۰/۵۰)۲۵	(۰/۶)۳	۲۰-۴۰ سال
۱۱۴/۷۵ IU/ml	(۰/۱۴)۷	(۰/۲)۱	(۰/۳۲)۱۶	(۰/۶)۳	۴۰-۶۰ سال
۲۷۷ IU/ml	۰	(۰/۲)۱	۰	(۰/۲)۱	بالاتر از ۶۰ سال
۱۷۳/۴۲ IU/ml	(۰/۳۲)۱۶	(۰/۶)۳	(۰/۸۴)۴۲	(۰/۱۶)۸	جمع کل

جدول ۲: اطلاعات زمینه ای (سن و جنس) و میزان IgG سرمی توکسوبلاسمای گوندی در پنجاه فرد غیر مبتلا به میگرن (گروه شاهد)

میانگین توکسوبلاسمای (IU/ml)	مبتلایان به توکسوبلاسمای تعداد (درصد)		مبتلایان به میگرن تعداد (درصد)		گروه سنی
	مرد	زن	مرد	زن	
-	۰	۰	(۰/۸)۴	(۰/۲)۱	کمتر از ۲۰ سال
۷۱/۲۵ IU/ml	(۰/۶)۳	(۰/۲)۱	(۰/۲۰)۱۰	(۰/۴)۲	۲۰-۴۰ سال
۴۹/۲ IU/ml	(۰/۶)۳	(۰/۴)۲	(۰/۳۸)۱۹	(۰/۴)۲	۴۰-۶۰ سال
۸۰/۱۴ IU/ml	(۰/۱۰)۵	(۰/۴)۲	(۰/۲۰)۱۰	(۰/۴)۲	بالاتر از ۶۰ سال
۶۸/۲۵ IU/ml	(۰/۲۲)۱۱	(۰/۱۰)۵	(۰/۸۶)۴۳	(۰/۱۴)۷	جمع کل

منفی) بود و این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود ($p<0.05$). کوسه اوغلی و همکاران (۲۰۰۹) در مطالعه خود میزان آنتی بادی ضد توکسوبلاسمای گوندی را با استفاده از روش الیزا در ۱۰۴ بیمار میگرنی، ۵۰ فرد سالم و ۵۰ فرد دچار سرددار ناشی از رینوسینوزیت اندازه گیری و مقایسه نمودند. بر اساس نتایج این مطالعه، ۴۴/۲٪ بیماران میگرنی، ۲۶٪ افراد سالم و ۲۴٪ افراد شاهد دچار رینوسینوزیت، از نظر IgG ضد توکسوبلاسمای گوندی مثبت بودند. نتایج این بررسی نشان داد که بین میگرن و عفونت مزمن توکسوبلاسمای گوندی ارتباط معنی داری وجود دارد. و احتمال دارد که عفونت توکسوبلاسمای در التهاب نوروژنیک و در پاتوژن میگرن نقش داشته باشد (۲۰). در بررسی دیگری که توسط آلواردو و همکاران در سال ۲۰۱۸ انجام شد ارتباط مشخصی بین عفونت توکسوبلاسمای

بحث

در مطالعه حاضر، ۵۰ نفر مبتلا به میگرن (گروه بیمار) و ۵۰ نفر غیر مبتلا به میگرن (گروه شاهد) انتخاب و از نظر آنتی بادی IgG ضد توکسوبلاسمای گوندی سرمی با استفاده از روش الیزا بررسی شدند. در انتخاب افراد برای مطالعه، معیارهای مهم ورود و خروج عبارت از سابقه درمان دارویی توکسوبلاسموز و میگرن بود. آلدگی به توکسوبلاسمای گوندی در گروه بیمار ۳۸ درصد و در گروه شاهد ۳۲ درصد بود. هر چند میزان ابتلا به توکسوبلاسموز در افراد میگرنی (گروه بیمار) ۶ درصد بیشتر از گروه شاهد بود، ولی این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود ($p=0.061$). از طرف دیگر، میانگین غلظت سرمی آنتی بادی IgG آنتی توکسوبلاسمای گوندی در گروه بیمار (میگرن مثبت) بیش از ۲/۵ برابر بالاتر از گروه شاهد (میگرن

میگرن، به طور مشخص و معنی داری بالاتر از افراد گروه شاهد بود ($p=0.26$).

نتیجه گیری

براساس یافته های مطالعه حاضر نتیجه گیری می شود که میزان ابتلا به توکسوبلاسموز مزمن در افراد مبتلا به میگرن (۳۸ درصد) تا حدودی بالاتر از افراد سالم و غیر مبتلا به میگرن (۳۲ درصد) بود و از طرف دیگر مقادیر و غلظت سرمی IgG ضد توکسوبلاسمای گوندی در افراد مبتلا به میگرن (۱۷۳/۴۲ IU/ml) به صورت مشخص و معنی داری بیشتر از افراد سالم (۶۸/۲۵ IU/ml) بود ($p=0.26$). از محدودیت های مطالعه حاضر، عدم تمايل به همکاری برخی از افراد انتخاب شده در انجام آزمایشات بود که منجر به جایگزینی این قبیل افراد می شد.

سپاس گزاری

این مقاله مستخرج از پایان نامه خانم نیلوفر جویانی دانش آموخته کارشناسی ارشد میکروب شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل می باشد. حامی مالی این تحقیق، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل بودند. نویسندهای مقاله از معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل و همچنین از کارکنان محترم آزمایشگاه آرین اردبیل تشکر و قدردانی به عمل می آورند.
حامی مالی: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
تعارض در منافع: وجود ندارد.

گوندی (از نظر IgG) و سردد بهدست نیامد. در این مطالعه، ۱۰۵ بیمار مبتلا به سردد مزمن (میگرن) و ۱۰۵ فرد سالم و فاقد سردد در بیمارستان عمومی شهر دورانگوی مکزیک از نظر مقادیر سرمی IgG و IgM ضد توکسوبلاسمای گوندی با روش الیزا بررسی شدند. ۴/۸ درصد افراد مبتلا به میگرن و ۶/۷ درصد افراد سالم دارای آنتی بادی سرمی IgG ضد توکسوبلاسمای گوندی بودند. هر چند درصد آلودگی به توکسوبلاسمای گوندی میگرنی کمتر از افراد غیر میگرنی بود ولی مقادیر و غلظت سرمی IgG ضد توکسوبلاسمای گوندی در افراد مبتلا به سردد مزمن (میگرنی) به طور معنی داری بیشتر از افراد سالم بود ($p=0.01$). در تحقیق انجام یافته توسط خادم وطن و همکاران (۲۰۱۴) وجود ارتباط بین عفونت توکسوبلاسمای گوندی و افزایش خطر ایتلا به شیزو فرنی تایید شد و نتایج این مطالعه نشان داد که افراد مبتلا به شیزو فرنی در مقایسه با گروه کنترل دارای فراوانی آنتی بادی IgG ضد توکسوبلاسمای گوندی بالاتری بوده اند (۲۱). یافته های مطالعه حاضر با نتایج مطالعه کوسه اوغلی تا حدودی مشابه دارد چرا که در مطالعه اخیر نیز درصد ابتلا به عفونت توکسوبلاسموز مزمن در بین افراد مبتلا به میگرن (۳۸ درصد) بالاتر از افراد سالم و غیر مبتلا به میگرن (۳۲ درصد) بود هر چند این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود ($p=0.061$). در عین حال، نتایج مطالعه حاضر از نظر غلظت سرمی IgG ضد توکسوبلاسمای گوندی در مطالعه آواردو مطابقت دارد. به خاطر اینکه مقادیر و غلظت سرمی آنتی بادی IgG ضد توکسوبلاسمای گوندی در مبتلایان به

References:

- 1-Gholamreza-Mirzaee M, Kheiri S, Khosravi S, Koshdel A, Keyvani Z, Amini Z. *Iron Therapy and Migraine Headache*. J Sharekord Univ Med Sci 2012; 13(6): 56-62. [Persian]
- 2-Celikbelik A, Adam M. *The Relationship between Dry Eye and Migraine*. Acta Neurol Belg 2015; 115(3): 329-33.
- 3-Sadeghian H, Karimzadeh F, Jafarian M. *Mechanisms Involved in Pathophysiology of Different Types of Migraines*. Shafaye Khatam 2013; 1(4): 50-54. [Persian]
- 4-Ahmadpanah M, Kakekhani H, Ghaderzadeh P. *Investigation of Prevalence and Clinical Characteristics of Migraine Patients Referred to The*

neurology department of Sina Hospital, 2010. Psj 2014; 12(4): 1-6. [Persian]

5-Ayatollahi SMT, Sahebi L, Borhani Haghighi A. *Epidemiologic and Clinical Characteristics of Migraine and Tension-Type Headaches among Hospitals Staffs of Shiraz (Iran).* Acta Medica Iranica 2009; 47(2): 115-120.

6-Ayatollahi SMT, Cheraghian B. *An Epidemiologic Model for Risk Factors of Migraine and Tension Type Headaches among Primary Schools Teachers of Shiraz, 2003.* J Kerman University of Medical Sciences 2005; 12(2): 85-92. [Persian]

7-Rajabi S, Abbasi Z. *The Epidemiology of Migraine Headaches and the Efficacy of Fordyce's Happiness Training on Reducing Symptoms of Migraine and Enhancing Happiness.* Contemporary Psychology 2015; 9(2): 89-100. [Persian]

8-Azizi M, Aghamohammadian Sharbaf HR, Mashhadi A, Asgari Ebrahimabad MJ. *A Meta-Analysis of Psychological Factors of Migraines in Iran.* Health Psychology 2017; 6(2): 88-100. [Persian]

9-Edrissian GhH, Rezaeian M, Ghorbani M, Keshavarz H, Mohebali M. *Medical Protozoology.* 1st ed. Tehran: Idenovin; 2015: 168-189. [Persian]

10-Dubey JP. *Toxoplasmosis of Animals and Humans.* 2 st ed. New York: CR Press, Taylor & Francis Group; 2010: 73-93.

11-Markell EK, Voge M, John DT. *Medical Parasitology.* Missouri: Saunder; 2006: 140-149.

12-Raeghi S, Rostamzade Z, Sepehrvand N. *Prevalence of Toxoplasma Gondii IgG and IgM in Kidney Transplant Patients in Urmia, 2009-2010.* JNKUMS 2011; 2(4): 29-32. [Persian]

13-Prandota J. *Migraine Associated with Patent Foramen Ovale may be caused by Reactivation of*

Cerebral Toxoplasmosis Triggered by Arterial Blood Oxygen Desaturation. Int J Neurosci 2010; 120(2): 81-7.

14-Sharbatkhori M, Dadi Moghaddam Y, Pagheh AS, Mohammadi R, Hedayat Mofidi H, Shojaee S. *Seroprevalence of Toxoplasma Gondii Infections in Pregnant Women in Gorgan City, Golestan Province, Northern Iran-2012.* Iranian J Parasitol 2014; 9 (2): 181-87.

15-Ahadi MT, Chinifroush M, Shokrabadi M, Amini S, Jafari AR. *A Seroprevalence Study of Toxoplasmosis in Pregnant Women in Ardabil, Iran, Using ECLIA Technique.* In: Medimond s.r.l. Proceedings of the XII International Congress of Parasitology ICOPA; 2010 Aug 15-20; Melbourne: Australia; 2010. P. 193-7.

16-Prandota J. *Recurrent Headache as the Main Symptom of Acquired Cerebral Toxoplasmosis in Nonhuman Immunodeficiency Virus-Infected Subjects with No Lymphadenopathy: The Parasite may be Responsible for the Neurogenic Inflammation Postulated as a Cause of Different Types of Headaches.* Am J Ther 2007; 14(1):63-105.

17-Flegr J. *Neurological and Neuropsychiatric Consequences of Chronic Toxoplasma Infection.* Curr Clin Micro Rpt 2015; 2: 163-72.

18-Butcher BA, Reese ML, Boothroyd JC, Denker EY. *Interactions between Toxoplasma Effectors and Host Immune Responses.* In: *Toxoplasma Gondii,* 2nd ed. Elsevier; 2014: 505-19.

19-Alvarado-Esquivel C, Rico-Almochantaf YDR, Sanchez-Anguiano LF, Quinones-Canales G, Hernandez-Tinoco J, Torres-Gonzalez J, et al. *Toxoplasma Gondii Infection and Headache: A Matched Case-Control Study in Public Hospital in*

Durango City, Mexico. J clin Med Res 2018; 10(1): 27-31.

20- Koseoglu E, Yazar S; Koc I. *Is Toxoplasma Gondii a Causal Agent in Migraine?* Am J Med Sci 2009; 338(2): 120-2.

21- Khademvatan S, Saki J, Khajeddin N, Izadi-Mazidi M, Beladi R, Shafiee B, et al. *Toxoplasma Gondii Exposure and the Risk of Schizophrenia.* Jundishapur J Microbiol 2014; 7(11): e12776.

Serum Level of Anti-*Toxoplasma Gondii* IgG among the Individuals with/without Migraine

Niloufar Jouyani¹, Mohammad Taghi Ahady^{*2}, Vahid Abbasi³

Original Article

Introduction: More than 500 million people throughout the world are infected with *Toxoplasma gondii*. On the other hand, migraine is known as the most common pain syndrome. The aim of this study was to detect anti-*Toxoplasma gondii* IgG in the serum of individuals with and without migraine.

Methods: In this descriptive-analytical study, 50 person (7 male & 43 female, in the age range of 20-60 years) with history and symptoms of migraine (case group), and 50 individuals (7 male & 43 female, in the age range of 20-60 years) without migraine (control group) were selected randomly. Blood samples (5 ml) were collected from all the selected people, and the serum level of anti-*Toxoplasma gondii* IgG were determined using Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) technique. In this test, 10 IU/ml of anti-*Toxoplasma gondii* IgG was considered as the minimum titer. For statistical analysis SPSS Inc, Chicago, IL; Version 18 software and -Chi-square and t-tests were used.

Results: 38% of the patients with migraine and 32% of the control group had anti-*Toxoplasma gondii* IgG above 10 IU/ml. The mean amount of anti-T. gondii IgG in the serums of case group was 173.42 IU/ml, while it was 68.25 IU/ml in the control group, the mean amount of Toxo-IgG in migraine positive group was 2.5 time higher than the amount in the control group ($p<0.05$).

Conclusion: According to the results of this study it is concluded that the serum level of anti-*Toxoplasma gondii* IgG in migraine positive persons is significantly higher than the migraine negative individuals. Therefore, it is recommended that the patients disordered with migraine be tested for chronic toxoplasmosis.

Keywords: Antibody IgG, *Toxoplasma gondii*, Chronic toxoplasmosis, Migraine, ELISA.

Citation: Jouyani N, Ahady MT, Abbasi V. Serum Level of Anti-*Toxoplasma Gondii* IgG among the Individuals with/without Migraine. J Shahid Sadoughi Uni Med Sci 2020; 28(1): 2315-23.

¹Department of Biology, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.

²Department of Biology, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.

³Department of Neurology, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran.

*Corresponding author: Tel: 09144515486, email: mot_ahadi@iauardabil.ac.ir