

بررسی اثر متغور مین بر روی برخی شاخص های رفتاری در موش سوری اوارکتومی شده

مریم ذاکری^۱، ایمان فاطمی^۲، محمدعلی ذاکری^۳، محمد الله توکلی^{۴*}

مقاله پژوهشی

مقدمه: پیری فرآیندی اجتناب ناپذیر است که باعث افزایش احتمال بیماری و مرگ افراد می‌شود. یائسگی به عنوان بخشی از فرآیند پیری رخ می‌دهد. در این مطالعه اثر متغور مین بر میزان قدرت عضلانی، اضطراب و حافظه در موش های سوری ماده اوارکتومی شده بررسی شد.

روش بررسی: در این مطالعه تجربی از ۹۶ سر موش سوری ماده ۶ ماهه در محدوده وزنی ۲۰ تا ۲۵ گرم استفاده شد. حیوانات به طور تصادفی به ۶ گروه ۱۶ تایی شامل گروه شم، اوارکتومی شده، اوارکتومی شده درمان با دوز ۱۰ میلی گرم بر کیلوگرم متغور مین، اوارکتومی شده درمان با دوز ۱ میلی گرم بر کیلوگرم متغور مین، گروه متغور مین درمان با دوز ۱۰ میلی گرم بر کیلوگرم متغور مین و گروه سالم تقسیم شدند. نخست حیوانات اوارکتومی شدند و سپس به مدت شش ماه با دوز های ۱۰ و ۱۰ میلی گرم بر کیلوگرم متغور مین درمان شدند. سپس قدرت عضلانی، حافظه و میزان اضطراب در گروه های مورد مطالعه بررسی شد. آنالیز آماری توسط نرم افزار SPSS V انجام و تفاوت بین گروه ها توسط آزمون واریانس یک طرفه تحلیل شد.

نتایج: نتایج مطالعه ما نشان داد که متغور مین با دوز های ۱۰ و ۱۰ میلی گرم بر کیلوگرم در مقایسه با گروه اوارکتومی میزان اضطراب حیوان را به طور معنی داری کاهش داد (به ترتیب $p = 0.0024$ و $p = 0.0295$) و باعث افزایش حافظه شد (به ترتیب $p = 0.0044$ و $p = 0.0004$) و دوز ۱۰ میلی گرم بر کیلوگرم باعث بهبود قدرت عضلانی شد ($p = 0.0148$).

نتیجه گیری: متغور مین دارای اثرات مفیدی بر روی اختلالات رفتاری ناشی از پیری و اوارکتومی می باشد.

واژه های کلیدی: پیری، متغور مین، اوارکتومی، قدرت عضلانی، حافظه، اضطراب

ارجاع: ذاکری مریم، فاطمی ایمان، ذاکری محمدعلی، الله توکلی محمد. بررسی اثر متغور مین بر روی برخی شاخص های رفتاری در موش سوری میانسال اوارکتومی شده. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوqi یزد ۱۳۹۷؛ ۲۶(۹): ۲۶-۲۰.

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

۲- استادیار گروه آموزشی فیزیولوژی-فارماکولوژی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی-فارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

۳- کارشناسی ارشد پرستاری، مرکز تحقیقات فیزیولوژی-فارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

۴- استاد گروه آموزشی فیزیولوژی-فارماکولوژی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی-فارماکولوژی، پژوهشکده علوم پایه پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

*نویسنده مسئول؛ تلفن: ۰۹۱۳۲۹۲۶۲۴۱، پست الکترونیکی: allahtavakoli@gmail.com

مقدمه

پیری، یک فرایند جهانی، پیش‌رونده، آسیب‌رسان و ذاتی است که در طول زمان با تجمع تدریجی آسیب‌های مختلف، کاهش کارایی عملکردی و هموستاز در بافت‌ها و سلول‌ها، همراه می‌باشد (۱،۲). انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۵ جمعیت سالمدنان (بیش از ۶۵ سال) بیش از ۸۰۰ میلیون نفر افزایش یابد (۳). افزایش سن با افزایش بیماری‌های مختلفی مانند ضعف عضلانی و ناتوانی همراه است (۴).

با افزایش تعداد سالمدنان جهان به دلیل رشد علم و تکنولوژی، مسئولیت اجتماعی و اقتصادی سنگینی بر دوش جامعه و خانواده می‌باشد (۳). تحقیقات نشان داده است توانایی حافظه به صورت وابسته به سن کاهش می‌یابد (۵). با توجه به سن به تدریج رسوب آمیلوبئید بتا افزایش می‌یابد. با توجه به تخریب ایجادشده عامل خطر عمدۀ برای افزایش اختلال شناختی و زوال عقل افزایش سن است (۶،۷).

توانایی‌های عملکردی عامل مهمی برای افراد سالخورده برای حفظ زندگی مستقل و مشارکت در فعالیت‌های خانوادگی و اجتماعی است (۲). پیری جمعیت یک واقعیت جهانی است. شناخته شده است که تغییرات در مشخصات سلامتی، بیماری‌های دژنراتیو مزمن، افزایش آسیب‌پذیری به محدودیت‌های عملکردی، از دست دادن استقلال فیزیکی و کیفیت زندگی با پیشرفت سن مرتبط است (۸).

یائسگی در زنان، یک فرآیند فیزیولوژیک پیچیده و نشان‌دهنده یک فرآیند پیری است که اغلب با اثرات جانبی پیری همراه است (۹-۱۱). کیفیت زندگی زنان ممکن است تحت تأثیر یائسگی قرار گرفته و سلامت آنان را به خطر بیندازد (۱۲). یکی از مراحل مهم زندگی یائسگی می‌باشد و بخشی از سالمندی است (۱۳). زنان پیش از یائسگی خواص عضلانی بهتری نسبت به زنان یائسه دارند در حالی که استفاده از درمان جایگزینی هورمون پس از یائسگی (HRT) تا حدی مانع از کاهش و یا حتی بهبود عملکرد عضله در زمان یائسگی می‌شود. درمان جایگزین هورمون شامل تجویز استروژن و پروژسترون می‌باشد (۱۰،۱۴). در یائسگی، علاوه بر عدم توانایی تولید مثل،

بدتر شدن خواص اسکلتی-عضلانی شروع به افزایش می‌کند که ممکن است منجر به تأثیرات زیادی در کیفیت زندگی و توانایی بهبودی از صدمات فیزیکی و درنهایت باعث کاهش سلامت زنان شود (۱۵-۱۷). گزارش‌ها نشان داده که زنان پس از یائسگی به علت پایین آمدن سطح استروژن دچار اختلالات عصبی از جمله اضطراب می‌شوند (۱۸). هم چنین هورمون‌های تخدمان می‌توانند مناطقی از مغز مثل حافظه و یادگیری را تحت تأثیر قرار دهند. استروژن نقش حفاظتی در برابر زوال عملکردهای شناختی دارد که با پیری طبیعی رخ می‌دهد (۱۹). در دوران یائسگی زنان در معرض تغییرات مختلف اندوکرینی، جسمی و روانی قرار می‌گیرند که این تغییرات هم به کاهش سطح استروژن مرتبط می‌باشند و هم به پیری (گذر سن) که برآورد کمی هر کدام به تنها یک امکان پذیر نیست (۲۰).

متغورمین از دسته داروهای بیگوانیدی است و به صورت خوارکی مصرف می‌شود و در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو اولین داروی انتخابی محسوب می‌شود. متغورمین از پرمصرف‌ترین کاهش‌دهندهای خوارکی قند خون است که باعث افت قند خون پایین‌تر از حد طبیعی بعد از مصرف آن نمی‌گردد. متغورمین برای موارد غیردیابتیک در درمان نازی و القا تخمک‌گذاری تجویز می‌گردد. متغورمین در درمان سندروم تخدمان پلی کیستیک نیز تجویز می‌شود (۲۱). مطالعات انسانی نشان می‌دهد که متغورمین ممکن است بروز بیماری‌های مرتبط با سن از جمله بیماری‌های قلبی عروقی، سرطان و مرگ و میر را مستقل از اثرات آن بر متابولیسم گلوکز کاهش دهد (۲۲،۲۳).

مکانیسم عمل متغورمین مشخص نیست ولی احتمالاً از طریق مهار گلوکونئوژنز تولید گلوکوز توسط کبد را کاهش می‌دهد و با تحریک انسولین میزان میزان جذب گلوکز را در عضله و بافت چربی افزایش می‌دهد. متغورمین از طریق فعال کردن پروتئین‌کیناز وابسته به آدنوزین‌مونوفسفات (AMPK) Adenosine monophosphate-activated protein kinase سبب وقوع مکانیسمی شده که نتیجه آن جلوگیری از افزایش قند خون است (۲۴). در تحقیقات متعدد، اثرات متغورمین بر

دارو داده نشد. گروه اوارکتومی به همراه ۱ میلی‌گرم بر کیلوگرم متغورمین، در این گروه موش‌ها ابتدا اوارکتومی شده و یک ماه پس از انجام اوارکتومی، به مدت ۶ ماه روزانه دوز ۱ میلی‌گرم بر کیلوگرم متغورمین در ۵ میلی‌لیتر آب آشامیدنی به صورت خوراکی دریافت کردند. گروه اوارکتومی به همراه ۱۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم متغورمین که حیوانات یک ماه بعد از انجام اوارکتومی به مدت ۶ ماه با متغورمین با دوز ۱۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم در ۵ میلی‌لیتر آب آشامیدنی درمان شدند. گروه متغورمین که در آن حیوانات سالم بوده و ۱۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم متغورمین روزانه در ۵ میلی‌لیتر آب آشامیدنی حیوان به صورت خوراکی و به مدت ۶ ماه دریافت کردند. گروه سالم که حیوانات سالم بوده و دارو دریافت نکردند.

روش اوارکتومی

ابتدا موش‌ها را با ترازو وزن کشی موش آزمایشگاهی با دقیق اندازه گیری ۰/۱ گرم، وزن کرده و سپس بیهوشی کامل توسط تزریق داخل صفاقی محلول کتابخانه سولفات ۵۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم و زایلازین ۴ میلی‌گرم بر کیلوگرم، صورت گرفت، سپس ناحیه شکمی شیو و محل جراحی استریل شد (با استفاده از محلول موضعی پوویدون آیداین ۱۰٪). بین پستان دوم و سوم حیوان را با استفاده از تیغ بیستوری شماره ۱۰ شکاف داده تخمدان را پیدا کرده و با دستگاه کوتوله رحمی را سوزانده و سپس تخمدان جدا و خارج شد. بعد از آن لایه‌های داخلی و خارجی را جداگانه با نخ بخیه شماره ۲/۰ بخیه کرده و در پایان kg/i.u ۲۲۰۰۰ پنی‌سیلین عضلانی به هر حیوان تزریق شد.

روش ارزیابی صحت اوارکتومی

برای مشاهده صحت انجام اوارکتومی بعد از گذشت سه روز از جراحی، به مدت شش روز اسمیر واژن حیوان بررسی شد (به وسیله بالب چند قطره نرمال‌سالین به واژن موش اضافه و آن را خارج کرده و سپس روی لام قرار داده و به حالت اسمیر پخش نموده و به وسیله میکروسکوپ نوری مشاهده شد) و با عدم مشاهده طرح سرخسی و سلول‌های شاخی، جراحی اوارکتومی تأیید گردید (۲۹). بعد از ارزیابی صحت اوارکتومی

القاء آپوپتوز و کاهش پرولیفراسیون سلول‌های سرطانی متنوع مانند سرطان پستان و تخمدان در محیط کشت مشاهده شده است (۲۵). متغورمین هم چنین باعث افزایش فعالیت AMPK و افزایش حفاظت آنتی‌اکسیدانی درنتیجه کاهش التهاب مزمن و تجمع آسیب اکسیداتیو می‌شود (۲۶). تحقیقات نشان داده که متغورمین، طول‌مدت سلامت و طول عمر را در موش‌ها افزایش می‌دهد (۲۷). در مطالعه قبلی که توسط این گروه انجام شد اثر متغورمین بر روی پیری القا شده با دی‌گالاکتوز بررسی شد نتایج این مطالعه نشان داد که تجویز متغورمین باعث بهبود قدرت عضلانی، حافظه و کاهش اضطراب می‌شود (۲۸). به این دلیل که هورمون درمانی عوارض جانبی زیادی دارد یافتن داروی دیگری که عوارض کمتری داشته باشد اهمیت زیادی دارد، همان‌طور که اشاره شد، متغورمین در طیف گسترده‌ای از اختلالات مرتبط با افزایش سن، ایفای نقش می‌کند؛ بنابراین این مطالعه به منظور بررسی اثر متغورمین بر قدرت عضلانی، اضطراب و حافظه در موش سوری ماده اوارکتومی شده انجام گرفت.

روش بررسی

در این مطالعه تجربی تعداد ۹۶ سرموش سوری ماده با سن ۶ ماه (تهیه شده از حیوان خانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان) که وزن ۲۰ تا ۲۵ گرم داشتند به طور تصادفی در ۶ گروه (۱۶ موش در هر گروه) مورد آزمایش قرار گرفتند و در اتاقی تحت شرایط آرام و با حداقل استرس، در شرایط ۱۲ ساعت تاریکی و ۱۲ ساعت روشنایی (۷ صبح تا ۷ شب روشنایی)، دمای ۲۳ درجه سانتی‌گراد و با دسترسی آزاد به آب و غذا نگهداری شدند.

حیوانات

حیوانات به طور تصادفی به ۶ گروه (۱۶ موش در هر گروه) تقسیم شدند. گروه شم که حیوانات تحت استرس جراحی قرار گرفتند و تمام مراحل جراحی اوارکتومی (به جز برداشتن تخمدان‌ها) بر روی آن‌ها انجام شد و هیچ دارویی داده نشد. گروه اوارکتومی شده، در این گروه موش‌ها اوارکتومی شده و

در مدت ۵ دقیقه‌ای که حیوان آزادانه در قسمت‌های مختلف ماز حرکت می‌کرد، تعداد دفعاتی که حیوان وارد راهرو باز می‌شد، تعداد دفعاتی که حیوان وارد راهرو بسته می‌شد؛ مدت‌زمانی که حیوان در راهرو باز باقی می‌ماند؛ و نهایتاً مدت‌زمانی که حیوان در راهرو بسته Plus-maze باقی می‌ماند به روش فیلم برداری اندازه‌گیری شد. منظور از ورود به راهرو باز یا بسته هنگامی است که هر چهار پای حیوان در راهرو مورد نظر قرار می‌گرفت. زمان گذرانده شده در هر راهرو نیز بر همین اساس محاسبه شد. برای هر حیوان درصد ورود به راهرو باز و درصد زمان گذرانده شده در راهرو باز به طریق زیر محاسبه شد:

% OAE = درصد ورود به راهرو باز / Open Arm Entries × ۱۰۰

% OAT = درصد زمان گذرانده شده در راهرو باز / % Open Arm Time

$$\text{OAE} = \frac{\text{تعداد ورود به راهرو باز}}{\text{تعداد ورود به راهرو باز و بسته}} \times 100$$

$$\text{OAT} = \frac{\text{مدت زمان گذرانده شده در راهرو باز}}{\text{مدت زمان گذرانده شده در راهرو باز و باز}} \times 100$$

افزایش معنی‌دار هر کدام از دو پارامتر فوق نشان دهنده کاهش اضطراب است. اگر چه فاکتور % OAE نسبت به فاکتور % OAT دارای حساسیت کمتری در ثبت رفتار اضطرابی و یا ضد اضطرابی حیوان است. هم چنین مجموع تعداد دفعات ورود به بازوها، به عنوان شاخصی برای فعالیت حرکتی حیوان در نظر گرفته شد (۳۲).

آزمون بررسی حافظه کاری با استفاده از ماز-Y شکل برای بررسی حافظه کاری، از تست رفتاری اندازه‌گیری رفتار تناوب در ماز Y شکل (Y-maze spontaneous alternation test) استفاده شد. در این آزمون میزان عملکرد حیوانات از نظر حافظه کاری از طریق مشاهده و اندازه‌گیری رفتار تناوب خودبه‌خودی حیوان در یک جلسه کاری مورد بررسی قرار گرفت. ماز مربوط به این آزمون از جنس پلکسی گلاس بود و هر بازو دارای ابعاد $15 \times 30 \times 40$ سانتی‌متر بوده و بازوها از طریق یک محوطه مرکزی به هم متصل شده‌اند. برای انجام

حیوانات به مدت ۶ ماه روزانه با دوزهای ۱ و ۱۰ میلی گرم بر کیلوگرم متغورمین درمان شدند (۲۸، ۳۰). در پایان مطالعه میزان قند خون تمام حیوانات اندازه‌گیری شد (با استفاده از دستگاه تست قند خون ایزی گلوكو (EASY GLUCO) محصول کشور آلمان ساخت شرکت Roche با زمان پاسخگویی ۹ ثانیه و دقت بالا می‌باشد).

روش اندازه‌گیری قند خون

برای اندازه‌گیری میزان قند خون در قسمت انتهای دم موش شیار کوچکی با استفاده از تیغ بیستوری ایجاد کرده و با استفاده از دستگاه تست قند خون میزان قند خون حیوانات اندازه‌گیری شد.

آزمون سنجش قدرت عضلانی

به منظور سنجش قدرت عضلانی حیوان را بر روی یک صفحه مشبک با ابعاد 50×50 سانتی‌متر قرار داده و سپس صفحه را برگرداندیم. مدت‌زمانی را که حیوان تلاش می‌کند خود را به صفحه متصل نگه دارد توسط کرونومتر ثبت شد پنج بار این عمل تکرار شد و عدد ثبت شده برای بار آخر به عنوان قدرت عضلانی در نظر گرفته شد (۳۱).

آزمون رفتار شبه اضطرابی

در این مطالعه برای سنجش اضطراب از آزمون رفتاری ماز به علاوه‌ای شکل (Elavated plus-maze) استفاده شد. این ابزار از جنس چوب و دارای چهار بازو به شکل علامت (+) است. ابعاد راهرو باز و بسته 50×10 cm بوده و دو طرف و انتهای راهرو بسته دیوارهای به بلندی 40 cm دارد که برای جلوگیری از افتادن موش‌ها در دو طرف و انتهای راهرو باز لبه‌ای به ارتفاع 1 cm از جنس شیشه نصب گردیده است. چهار راهرو به یک محدوده مرکزی به ابعاد 10×10 cm منتهی می‌شوند. ماز توسط پایه‌هایی در ارتفاع 50 cm از سطح زمین قرار گرفت. موش‌ها درون محدوده مرکزی ماز قرار داده شدند، به طوری که رو به یک راهرو باز قرار گیرند. نور مناسب توسط یک لامپ ۱۰۰ واتی که در ارتفاع 120 سانتی‌متر از مرکز ماز قرار داشت تأمین شد.

تعییبی توکی استفاده شد. هم چنین از آزمون آنوا با اندازه‌گیری مکرر برای مقایسه داده‌ها استفاده گردید؛ و در تمام برسی‌ها $p < 0.05$ به عنوان سطح معنی‌دار در نظر گرفته شد (۳۴).

ملاحظات اخلاقی

پروپوزال این تحقیق توسط دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان تایید شده است (کد اخلاق IR.RUMS.REC.1397.058).

نتایج

اثر متغورمین بر میزان قند خون در گروه‌های مختلف مورد مطالعه

نسبت تناوب صحیح مشاهده شده نتایج **قند خون عالمه مانشل داد میزان قند خود لذت‌گیری‌های حداکثر تناوب** مختلف مورد مطالعه تعییر معنی‌داری نداشته است (نمودار ۱).

اثر متغورمین بر قدرت عضلانی


نتایج آزمون قدرت عضلانی نشان داد که قدرت عضلانی در گروه اوارکتومی نسبت به گروه سالم کاهش معنی‌داری نشان داده است ($p = 0.049$). قدرت عضلانی در گروه اوارکتومی به همراه ۱۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم متغورمین نسبت به گروه اوارکتومی افزایش معنی‌داری نشان داده است ($p = 0.048$) (نمودار ۲).

آزمون هر موش صحرایی در قسمت انتهایی یک بازو قرار داده شد و امکان دسترسی آزاد آن به تمام نواحی ماز در یک دوره زمانی ۸ دقیقه فراهم شد. تعداد دفعات ورود حیوان به داخل هر بازو با مشاهده نمودن ثبت شد. ورود حیوان به داخل یک بازو زمانی ثبت شد که پاهای عقبی حیوان به طور کامل در داخل بازو قرار می‌گرفت. رفتار تناوب به عنوان ورود های موفق و پشت سر هم به داخل تمام بازوها در مجموعه های سه‌تایی در نظر گرفته شد. بدین ترتیب درصد تناوب از نسبت تناوب مشاهده شده به حداکثر تناوب $\times 100$ محاسبه گردید.


پس از پایان هر تست برای هر موش، ماز γ شکل با الکل 10% تمیز شد و در بین تریال‌های آزمایش تمیزکاری با الکل انجام نشد (۳۳).

تجزیه و تحلیل آماری

در این تحقیق جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار EXCEL و آنالیز داده‌ها به کمک نرم‌افزار SPSS V 16 انجام شد. تمام نتایج به صورت انحراف معیار \pm میانگین گزارش شد. برای مقایسه بین گروهی از واریانس یک‌طرفه و تست



نمودار ۱: اثر دوز‌های مختلف متغورمین بر میزان قند خون در گروه‌های مختلف مورد مطالعه.



نمودار ۲: اثر تجویز متغورمین بر روی میزان خستگی عضلانی در گروه‌های مختلف مطالعه

* در مقایسه با گروه اوارکتومی، # در مقایسه با گروه سالم.


درصد دفعات ورود به بازوی باز در گروه‌های مختلف مورد مطالعه تفاوت معنی‌داری نشان نداد (نمودار ۴)

اثر متغورمین بر حافظه


نتایج آزمون ماز Y شکل نشان داد که اوارکتومی به طور معنی‌داری باعث کاهش حافظه در گروه اوارکتومی نسبت به گروه سالم شد ($p = 0.0006$), در گروه اوارکتومی به همراه ۱ میلی‌گرم بر کیلوگرم متغورمین، حافظه به طور معنی‌داری نسبت به گروه اوارکتومی افزایش یافته است ($p = 0.0044$), در گروه اوارکتومی به همراه ۱۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم متغورمین، حافظه به طور معنی‌داری نسبت به گروه اوارکتومی شد (نمودار ۵).

اثر متغورمین بر رفتار شبه اضطرابی


نتایج آزمون ماز به علاوه نشان داد که اوارکتومی به طور معنی‌داری باعث کاهش درصد مدت زمان ماندن در بازوی باز در گروه اوارکتومی نسبت به گروه سالم شد ($p < 0.001$), که نشان‌دهنده افزایش اضطراب در گروه اوارکتومی است. متغورمین با دوز ۱ میلی‌گرم بر کیلوگرم باعث افزایش معنی‌دار درصد مدت زمان ماندن در بازو باز نسبت به گروه اوارکتومی شد ($p = 0.0024$). متغورمین با دوز ۱۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم باعث افزایش معنی‌دار درصد مدت زمان ماندن در بازو باز نسبت به گروه اوارکتومی شد ($p = 0.0095$) که نشان‌دهنده کاهش اضطراب است (نمودار ۳).



نمودار ۳: اثر تجویز متغورمین بر روی درصد مدت زمان ماندن در بازوی باز در گروه‌های مختلف مطالعه. * در مقایسه با گروه اوارکتومی، # در مقایسه با گروه اوارکتومی، \$ در مقایسه با گروه سالم.



نمودار ۴: اثر تجویز متغورمین بر روی درصد میزان ورود به بازوی باز در گروه‌های مختلف مطالعه.



نمودار ۵: اثر تجویز متغورمین بر حافظه در گروههای مختلف مطالعه. $p = 0.0004$ (در مقایسه با گروه اوارکتومی)

* ($p = 0.0044$) در مقایسه با گروه اوارکتومی، # ($p = 0.0006$) در مقایسه با گروه سالم.

دیازپام می‌تواند گزینه درمانی مناسبی در مدیریت دیابت و استرس باشد (۳۷). به نظر می‌رسد که متغورمین از طریق اثرات ضد رادیکال آزاد باعث کاهش اضطراب در موش‌های پیر می‌شود. با افزایش سن حافظه کاهش می‌یابد هم چنین یکی از شایع‌ترین عوارض یائسگی اختلال در حافظه و یادگیری است که علت آن اختلال در عملکرد و از بین رفتن نورون‌های ناحیه هیپوکمپ می‌باشد. مطالعات مختلفی اختلال در عملکرد هیپوکمپ، کاهش حافظه و یادگیری را در شرایط اوارکتومی و فقدان هورمون‌های جنسی در موش‌ها نشان داده‌اند (۲۹). نتایج مطالعه ما نیز نشان داد که حافظه در پیری و در موش‌های اوارکتومی شده کاهش می‌یابد. هم چنین نتایج مطالعه ما نشان داد که متغورمین باعث بهبود حافظه در شرایط یائسگی و در موش‌های پیر می‌شود. در مطالعه‌ای D Garabandu نشان داد که درمان با متغورمین می‌تواند از فعال شدن واسطه‌های استرس اکسیداتیو و التهاب سلولی که منجر به آپوپتوز می‌شوند، جلوگیری کند (۳۸). Wang J نشان داد که اختلال یادگیری و اختلال حافظه با اختلال در نوروزنر هیپوکامپ همراه است؛ و درمان با متغورمین باعث افزایش نوروزنر در هیپوکمپ می‌شود (۳۹). مطالعات دیگری نشان‌دهنده اثرات مفید متغورمین بر روی حافظه و یادگیری می‌باشند (۴۰). Ghasemi Abhari نشان داد متغورمین به صورت وابسته به دوز می‌تواند اختلال یادگیری و حافظه

بحث

نتایج این مطالعه نشان داد که تجویز متغورمین باعث کاهش اضطراب، بهبود قدرت عضلانی و حافظه در شرایط شبه یائسگی و پیری می‌شود. در پیری اضطراب افزایش پیدا می‌کند به نظر می‌رسد که این اضطراب به دلیل بیماری‌ها و ترس از مرگ در افراد سال خورده ایجاد می‌شود. در مطالعات مختلف مشاهده شده که رفتارهای اضطرابی در موش‌های پیر بیشتر است (۳۵).

گزارش‌های مختلف نشان داده که زنان پس از یائسگی به علت پایین آمدن سطح استروژن دچار اختلالات عصبی از جمله اضطراب می‌شوند (۱۸). نتایج مطالعه ما هم نشان داد که در موش‌های پیر اضطراب افزایش پیدا می‌کند و اوارکتومی باعث بالا رفتن سطح اضطراب در موش‌های اوارکتومی شده می‌شود. هم چنین نتایج مطالعه ما نشان داد که متغورمین اضطراب را کاهش می‌دهد. در مطالعه قبلی که توسط این گروه انجام گرفت نیز اثر متغورمین بر روی پیری القاشه با دی گالاكتوز بررسی شد. نتایج این مطالعه نشان داد که تجویز متغورمین باعث بهبود قدرت عضلانی، حافظه و کاهش اضطراب می‌شود (۲۸). Sarkaki و همکارانش نشان دادند که متغورمین باعث بهبود رفتارهای شبه اضطرابی در سکته گذرای مغزی در موش می‌شود (۳۶). در مطالعه‌ای اثر تجویز همزمان متغورمین و دیازپام بررسی شد و نشان داده شد که متغورمین در ترکیب با

عضلانی، افزایش رادیکال‌های آزاد به دلیل عدم تعادل بین سیستم آنتی‌اکسیدانی و اکسیدانی بدن، اشاره کرد (۴۳). Izzo و همکارانش دریافتند که متغورمین می‌تواند به طور خاص باعث بهبود عملکرد میتوکندری در موش‌های مدل سندروم داون از طریق افزایش مصرف اکسیژن، تولید ATP و تغییر در فعالیت کلی میتوکندری، شود. بر این اساس، ممکن است متغورمین قدرت عضلات اسکلتی را از طریق بهبود عملکرد میتوکندری افزایش دهد (۴۵).

نتیجه‌گیری

از یافته‌های این مطالعه نتیجه‌گیری می‌شود که درمان با متغورمین دارای اثرات مفیدی بر روی اختلالات ناشی از پیری و اوارکتومی می‌باشد. نتایج مطالعه اخیر پیشنهاد می‌کند که می‌توان از اثرات مفید متغورمین به منظور کاهش اضطراب، افزایش حافظه و بهبود قدرت عضلانی در افراد پیر و خانم‌های یائسه استفاده کرد. البته مطالعات بیشتری در این زمینه لازم است.

سپاسگزاری

نتایج ارائه شده در این کار از پایان‌نامه کارشناسی ارشد مریم ذاکری به دست آمد. این مطالعه با کمک مالی از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان به شماره قرارداد ۳۱۲۰/۱۹۷۱۵۷ صورت پذیرفته است.
تعارض در منافع: وجود ندارد.

فضایی موش‌های آلزایمری مدل استرپتوزوسین را بهبود بخشد؛ بنابراین متغورمین می‌تواند برای درمان بیماری‌های ناشی از زوال نورون‌های مغز مانند آلزایمر و بیماری‌های آسیب مغزی مفید باشد (۴۱). Wang و همکارانش در سال ۲۰۱۲ در مطالعه‌ای دریافتند که متغورمین در حضور انسولین کافی می‌تواند از طریق افزایش حساسیت نورون‌ها به انسولین باعث افزایش محافظت از نورون‌ها در مقابل استرس اکسیداتیو و هم چنین پدیده آپوپتوز شود و در نهایت یادگیری را افزایش دهد (۴۲). عملکرد عضلات اسکلتی با افزایش سن کاهش می‌یابد، که، در ابتدا با کاهش تحرک، توده ماهیچه‌ای و قدرت انقباضی در کیفیت زندگی افراد مسن تأثیر می‌گذارد (۴۳). در مطالعه‌ای که توسط Khaluoi و همکاران انجام شد متغورمین باعث بهبود عملکرد عضلانی شد (۲۸). نتایج مطالعات ما نیز این موضوع را تأیید کرد نتایج مطالعات ما نشان داد که متغورمین باعث افزایش زمان خستگی عضلانی می‌شود نتایج مطالعه ما نشان داد که متغورمین بهخصوص با دوز ۱۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم باعث بهبود قدرت عضلانی در موش‌های یائسه شد. خستگی عضلانی به عنوان کاهش و عدم توانایی ورزش کار در تولید و حفظ نیرو و قدرت عضلانی تعریف می‌شود که در طولانی‌مدت منجر به کاهش عملکرد ورزشکار می‌شود (۴۴). دلایل متعددی برای خستگی عضلانی ذکر شده است، از این دلایل می‌توان به کاهش منابع انرژی مانند گلیکوژن عضلات اسکلتی، تولید و انباست متabolیت‌هایی نظیر اسیدلاکتیک و آمونیاک در سرم و عضلات، التهاب عصبی و

References:

- 1-Vina J, Borras C, Miquel J. *Theories of ageing*. IUBMB Life 2007; 59(4-5): 249-54.
- 2-Grimby G, Danneskiold-Samsoe B, Hvid K, Saltin B. *Morphology and enzymatic capacity in arm and leg muscles in 78–81 year old men and women*. Acta Physiol Scand 1982; 115(1): 125-34.
- 3-Anderson W, Cowan N. *Hand grip pressure in older people*. Br J prev Soc Med 1966; 20(3): 141-47.

- 4-**Stebbins GT, Carrillo MC, Dorfman J, Dirksen C, Desmond JE, Turner DA, et al. *Aging effects on memory encoding in the frontal lobes.* Psychol Aging 2002; 17(1): 44-55.
- 5-**Hardy R, Kuh D. *Change in psychological and vasomotor symptom reporting during the menopause.* Soc Sci Med 2002; 55(11): 1975-88.
- 6-**Wend K, Wend P, Krum SA. *Tissue-specific effects of loss of estrogen during menopause and aging.* Front Endocrinol 2012; 3: 19.
- 7-**Sipila S, Taaffe dr, Cheng S, Puolakka J, Toivanen J, Suominen H. *Effects of hormone replacement therapy and high-impact physical exercise on skeletal muscle in post-menopausal women: a randomized placebo-controlled study.* Clin Sci 2001; 101(2): 147-57.
- 8-**Orr R, Raymond J, Singh MF. *Efficacy of progressive resistance training on balance performance in older adults.* Sports Med 2008; 38(4): 317-43.
- 9-**Lowe DA, Baltgalvis KA, Greising SM. *Mechanisms behind estrogens' beneficial effect on muscle strength in females.* Exercise sport Sci Rev 2010; 38(2): 61-7.
- 10-**Arpels JC. *The female brain hypoestrogenic continuum from the premenstrual syndrome to menopause. A hypothesis and review of supporting data.* J Reprod Med 1996; 41(9): 633-9.
- 11-**Pompili A, Arnone B, Gasbarri A. *Estrogens and memory in physiological and neuropathological conditions.* Psychoneuroendocrinology 2012; 37(9): 1379-96.
- 12-**Patel R, Shah G. *Effect of metformin on clinical, metabolic and endocrine outcomes in women with polycystic ovary syndrome: a meta-analysis of randomized controlled trials.* Curr Med Res Opinion 2017; 33(9):1545-57.
- 13-**Detaille D, Guigas B, Chauvin C, Batandier C, Fontaine E, Wiernsperger N, et al. *Metformin prevents high-glucose-induced endothelial cell death through a mitochondrial permeability transition-dependent process.* Diabetes 2005; 54(7): 2179-87.
- 14-**Viollet B, Guigas B, Garcia NS, Leclerc J, Foretz M, Andreelli F. *Cellular and molecular mechanisms of metformin: an overview.* Clin Sci 2012; 122(6): 253-70.
- 15-**Martin-Montalvo A, Mercken EM, Mitchell SJ, Palacios HH, Mote PL, Scheibye-Knudsen M, et al. *Metformin improves healthspan and lifespan in mice.* Nature Commun 2013; 4: 2192.
- 16-**Gambaryan P, Kondrasheva I, Severin E, Guseva A, Kamensky A. *Increasing the Efficiency of Parkinson's Disease Treatment Using a poly (lactic-co-glycolic acid)(PLGA) Based L-DOPA Delivery System.* Exp Neurobiol 2014; 23(3): 246-52.
- 17-**Hakimizadeh E, Oryan S, Shamsizadeh A, Roohbakhsh A. *Endocannabinoid system and TRPV1 receptors in the dorsal hippocampus of the rats modulate anxiety-like behaviors.* Iran J Basic Med Sci 2012; 15(3): 795-802.

- 18-** Xia E, RAO G, Van Remmen H, Heydari AR, Richardson A. *Activities of Antioxidant Enzymes in Various Tissues of Male Fischer 344 Rats Are Altered by Food Restriction* J Nutr 1995; 125(2): 195-201.
- 19-** Parikh I, Guo J, Chuang KH, Zhong Y, Rempe RG, Hoffman JD, et al. *Caloric restriction preserves memory and reduces anxiety of aging mice with early enhancement of neurovascular functions*. Aging 2016; 8(11): 2814-26.
- 20-** Sarkaki A, Farbood Y, Badavi M, Khalaj L, Khodagholi F, Ashabi G. *Metformin improves anxiety-like behaviors through AMPK-dependent regulation of autophagy following transient forebrain ischemia*. Metab Brain Dis 2015; 30(5): 1139-50.
- 21-** Garabadu D, Krishnamurthy S. *Diazepam potentiates the antidiabetic, antistress and anxiolytic activities of metformin in type-2 diabetes mellitus with cooccurring stress in experimental animals*. BioMed research international 2014; 2014: 15.
- 22-** Alimohammadi R, Naderi S, Allahtavakoli M. *Effects of exercise and estrogen on anxiety-like behaviors ovariectomized Mice*. JBUMS 2015; 17(12): 40-46.
- 23-** Garabadu D, Krishnamurthy S. *Diazepam potentiates the antidiabetic, antistress and anxiolytic activities of metformin in type-2 diabetes mellitus with cooccurring stress in experimental animals* Biomed Res Int 2014; 2014: 693074.
- 24-** Mousavi SM, Niazmand S, Hosseini M, Hassanzadeh Z, Sadeghnia HR, Vafaee F, et al. *Beneficial Effects of Teucrium polium and Metformin on Diabetes-Induced Memory Impairments and Brain Tissue Oxidative Damage in Rats*. Int J Alzheimers Dis 2015; 2015: 493729.
- 25-** Ghasemi Abhari L, Esmaeili M, Benanaj M. *Effects of Metformin Intra Ventricular Injection on Learning and Spatial Memory in Streptozotocin Rat Model of Alzheimer's Disease*. J Shahid Sadoughi Uni Med Sci 2015; 23(1): 1764-75.
- 26-** Wang J, Gallagher D, DeVito LM, Cancino GI, Tsui D, He L, et al. *Metformin activates an atypical PKC-CBP pathway to promote neurogenesis and enhance spatial memory formation*. Cell Stem Cell 2012; 11(1): 23-35.
- 27-** Williams GN, Higgins MJ, Lewek MD. *Aging skeletal muscle: physiologic changes and the effects of training*. Physical Therapy 2002; 82(1): 62-8.
- 28-** Fatemi I, Khaluoi A, Kaeidi A, Shamsizadeh A, Heydari S, Allahtavakoli MA. *Protective effect of metformin on D-galactose-induced aging model in mice*. Iran J Basic Med Sci 2018; 21(1): 19-25. [Persian]
- 29-** Zhang Y, Wang B. *Effects of polysaccharides from Cordyceps sinensis mycelium on physical fatigue in mice*. Bangladesh J Pharmacol 2012; 7(3): 217-21.

Investigate the effect of metformin on some of the behavioral indicators in ovariectomized middle aged mice

Maryam Zakeri¹, Iman Fatemi^{1,2}, Mohammad Ali Zakeri¹, Mohammad Allahtavakoli^{*1,2}

Original Article

Introduction: Aging process is inevitable, which increases the risk of illness and death in people. Menopause occurs as a part of the aging process. The aim of this study was to evaluate the effect of metformin (Met) on muscle strength, anxiety and memory in ovariectomized mice

Methods: This was an experimental study. 96 female mice (Age 6 months) (20-25 g) were randomly divided into sex groups, including: (1) sham, (2) ovariectomized, (3 and 4) ovariectomized + Met (1 and 10 mg/kg) (5) Met 10 mg/kg, and (6) healthy. At first, the mice were ovariectomized and then received Met for six months. Muscle strength, memory, and anxiety in the experimental groups was examined. Statistical analysis was performed via SPSS16 and the differences between groups were analyzed by one way ANOVA.

Results: The results of the study showed Met with doses of 1 mg / kg and 10 mg significantly reduced the anxiety of mice ($p = 0.0295$ and $p = 0.0024$, respectively), increased memory ($p = 0.0004$ and $p = 0.0044$, respectively) and at dose of 10 mg / kg it improved muscle strength ($p = 0.0148$) compared to the ovariectomy group.

Conclusion: Metformin has beneficial effects on behavioural manifestations of aging and ovariectomy.

Keywords: Aging, Metformin, Ovariectomy, Muscle strength, Memory, Anxiety

Citation: Zakeri M, Fatemi I, Zakeri MA, Allahtavakoli, M. **Investigate the effect of metformin on some of the behavioral indicators in ovariectomized middle aged mice.** J Shahid Sadoughi Uni Med Sci 2019; 26(9): 910-20

¹Student Research Committee, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran

²Physiology-Pharmacology Research Center, Research Institute of Basic Medical Sciences, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran; Department of Physiology and Pharmacology, School of Medicine, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran.

*Corresponding author: Tel: 09132926241, email: allahtavakoli@gmail.com